

Acrobat[®] MZ WG

Kombiniertes Fungizid gegen Krankheiten in Kartoffeln und Zwiebeln

- › Fungizid mit Kontakt- und Tiefenwirkung
- › Zwei Wirkstoffe mit vorbeugender Wirkungsweise
- › Durchgehend einsetzbar

Wirkstoffe

Dimethomorph 78 g/kg
Mancozeb 663 g/kg

Formulierung

Wasserdispergierbares Granulat (WG)

Wirkungsweise

Acrobat MZ WG hat eine vorbeugende Wirkung von ca. 8–10 Tagen. Mancozeb schützt die Pflanze von aussen. Dimethomorph wirkt lokal-systemisch, infektionsabstoppend und vorbeugend. Dimethomorph wird schnell vom Blattgewebe aufgenommen, regelmässig im gesamten Blattinnern verteilt und kann somit, vor Abwaschung durch Regen geschützt, seine Wirkung entfalten. Der andersartige Wirkungsmechanismus von Dimethomorph ermöglicht eine effiziente Antiresistenz-Strategie.

Anwendung

Kartoffeln

2,5 kg/ha gegen Kraut- und Knollenfäule (*Phytophthora infestans*) und Dürrfleckenkrankheit (*Alternaria solani*).
Ab Saisonbeginn bis ca. Ende Juli/ Anf. August, in Abständen von ca. 8 bis 10 Tagen. Die Spritzabstände

sind der Witterung und dem Neuzuwachs anzupassen.

Wartefrist 3 Wochen (Frühkartoffeln: 2 Wochen).

Zwiebeln

2,5 kg/ha gegen Falschen Mehltau. Ab Saisonbeginn bis 2 Wochen vor der Ernte, in Abständen von ca. 8 bis 10 Tagen. Acrobat MZ WG ist die ideale Ergänzung zu Ridomil Gold, Bravo 500 und Amistar.

Brühezubereitung

Tank zur Hälfte mit Wasser füllen, Acrobat MZ WG zugeben, dann unter laufendem Rührwerk mit Wasser auffüllen.

Beachten

Brühemenge nicht unter 300 l/ha.
Druck mindestens 3 bar.
Fahrgeschwindigkeit maximal 6 km/h.

Mischbarkeit

Acrobat MZ WG kann mit anderen Fungiziden, Insektiziden und Abbrechmitteln gemäss Syngenta-Ratgeber gemischt werden. Bei Mischungen zuerst Acrobat MZ WG in den Spritztank geben und erst dann die anderen Produkte hinzufügen.

Packungsgrösse

5 kg (4 x 5 kg)

Marke

® Registered trademark of BASF

Gefahrenhinweise

N Umweltgefährlich
Xi Reizend

Version

03/2009