

# Fonganiil®

## Systemisches Fungizid gegen Falschen Mehltau und andere Pilze bei Zierpflanzen und Gemüsearten

- › Präventive und kurative Wirkung
- › Gute Pflanzenverträglichkeit
- › Längere Spritzintervalle

### Wirkstoff

Metalaxyl-M (480 g/l)

### Formulierung

Wasserlösliches Konzentrat (SL)

### Wirkungsweise

Fonganiil wirkt sowohl systemisch wie vorbeugend. Der Wirkstoff wird von den Wurzeln aufgenommen und breitet sich in der ganzen Pflanze aus. Im Falle von bereits sichtbaren Krankheitssymptomen ist es möglich, mit Fonganiil das Wachstum der Pilze zu stoppen und deren weitere Ausbreitung zu verhindern.

### Anwendung

#### Zierpflanzen

Gegen Falschen Mehltau, *Phytophthora* spp. und *Pythium* spp.

- Giessbehandlung: 0,01 – 0,02%, erste Behandlung unmittelbar nach der Pflanzung, zweite Behandlung 3 Wochen später. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
- Spritzbehandlung: 0,02%. Maximal 3 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
- Substratbehandlung: 25 ml/m<sup>3</sup> Pflanzenerde. Der Pflanzenerde vor der Inkulturnahme beimischen oder in die oberste Bodenschicht einarbeiten.

In Anbetracht der Verschiedenheit der Kulturmethode und der Reichhaltigkeit des Arten- und Sortenangebots wird empfohlen, die Pflanzenverträglichkeit vor einem Einsatz des Produktes abzuklären. Eine solche Prüfung der Pflanzenverträglichkeit von Fonganiil wird besonders vor dem Einsatz in nachstehend nicht aufgeführten Gattungen empfohlen.

In der empfohlenen Anwendung wurde Fonganiil in unseren Versuchen von den nachstehend aufgeführten Zierpflanzen gut vertragen: *Ageratum*, *Alstroemeria*, *Alyssum*, *Anthurium*, *Antirrhinum*, *Aphelandra*, *Aralia*, *Asplenium*, *Aucuba*, *Azalea*, *Begonia*, *Clerodendrum*, *Calluna*, *Camellia*, *Celosia*, *Columnea*, *Chamaecyparis*, *Chrysanthemum*, *Cineraria*, *Cissus*, *Crocus*, *Croton*, *Cuphea*, *Cyclamen*, *Daboëcia*, *Dianthus*, *Dieffenbachia*, *Douglasia*, *Draceana*, *Echeveria*, *Erica*, *Ficus*, *Geranium*, *Gerbera*, *Gloxinia*, *Hedera*, *Hyacinthus*, *Impatiens*, *Iris*, *Juniperus*, *Kalanchoe*, *Larix*, *Ligustrum*, *Lilium*, *Matthiola*, *Monstera*, *Pelargonium*, *Peperomia*, *Petunia*, *Philodendron*, *Photinia*, *Pilea*, *Pinus*, *Pittosporium*, *Poinsettia*, *Pseudotsuga*, *Phipsalis*, *Rhododendron*, *Rizinus*, *Santapaulia*, *Salvia*,

*Schefflera*, *Scindapsus*, *Sedum*, *Solanum*, *Syngonium*, *Tagetes*, *Tamarix*, *Tulipa*, *Verbena*, *Vinca*, *Viola*.

#### Küchenkräuter

Gegen Falschen Mehltau  
Spritzbehandlung: 0,02 – 0,022%,  
Wartefrist: 3 Wochen.

#### Karotten

0,5 l/ha gegen *Pythium* (Umfallkrankheit) im Stadium 11–14 (1–4-Blatt).  
Maximal 1 Behandlung.

#### Chicorée

Gegen Fussfäule (*Phytophthora cryptogaea*) zu Beginn der Treiberei.  
Tauchbehandlung der Wurzeln: 10 ml/hl. Spritzbehandlung der Wurzeln: 4 ml/t. Wartefrist: 3 Wochen.

### Beachten

Nur auf feuchte Ballen giessen, damit das Mittel tief eindringen kann. Gegen andere Erreger, wie z.B. *Rhizoctonia*, *Botrytis* und *Fusarium*, sind Zusatzbehandlungen mit anderen Produkten nötig.

### Mischbarkeit

Wir empfehlen, Fonganiil allein anzuwenden. Allfällige Mischungen mit anderen Fungiziden und Insektiziden sollten zuerst aufgrund der unterschiedlichen Verhältnisse kleinflächig ausgetestet werden.

## **Brühezubereitung**

Abgemessene Menge Fonganiil  
unter Umrühren in die vorgelegte  
Wassermenge schütten.

## **Packungsgrößen**

1 l (12 x 1 l)

## **Marke**

® Registered trademark of a  
Syngenta Group Company

## **Gefahrenhinweis**

Xn Gesundheitsschädlich

## **Version**

01/2010