

Stomp[®] sc

Herbizid mit Dauerwirkung gegen einjährige Ungräser und Unkräuter

- › Erfasst Problemunkräuter wie Gluren, Klebern, Ehrenpreis usw.
- › Gute Dauerwirkung

Wirkstoff

36,2% Pendimethalin (400 g/l)

Formulierung

Suspensionskonzentrat (SC)

Wirkungsweise

Stomp SC hemmt die Keimung und die Wurzelentwicklung auflaufender Unkräuter und Ungräser.

Die beste Wirkung wird bei möglichst feinkrümligem Saatbeet, ausreichender Bodenfeuchtigkeit und genügend Niederschlägen nach der Anwendung erreicht.

Die meisten Unkräuter sind im 1–3-Blatt-Stadium am empfindlichsten (Kamillen und Gräser im Keimstadium). Der Wirkstoff bewegt sich in der Pflanze sehr wenig, weshalb vor allem auf junge Gräser und Unkräuter eine gute Wirkung erzielt wird.

Anwendung

Kultur	Produkte	Aufwandmenge pro ha			Zeitpunkt / Bemerkungen
		Leichte Böden	Mittlere Böden	Schwere / humose B.	
Gemüse					
Fenchel	Stomp SC	2 l	2,5–3 l	4 l	Sofort bis 5 Tage nach der Saat.
Karotten	Stomp SC	3 l +	4 l +	4 l +	Sofort bis 3 Tage nach der Saat.
	+ Molipan Pro	0,5 kg	1 kg	1 kg	
Kohlgewächse gepflanzt	Stomp SC	4 l	4 l	5 l	Vor der Pflanzung. Nicht bei Saaten anwenden.
Lauch gepflanzt	Stomp SC	3–4 l +	4 l +	4 l +	Bis 5 Tage nach der Pflanzung.
	+ Molipan Pro	0,4 kg	0,4 kg	1 kg	
Lauch, gesät	Stomp SC	2 l	2,5 l	4–5 l	Sofort bis 5 Tage nach der Saat.
Sellerie gepflanzt	Stomp SC	3 l +	4 l +	4 l +	Sofort nach dem Pflanzen.
	+ Molipan Pro	0,4 kg	0,4 kg	1 kg	
Schwarzwurzel	Stomp SC	2 l	2,5 l	4 l	Sofort bis 5 Tage nach der Saat.
Zwiebeln gesät	Stomp SC	2 l	2,5	4 l	Sofort bis 5 Tage nach der Saat.
	Ein stärkerer Regenfall in den Tagen nach der Behandlung kann zur Phytotoxizität führen. Nur leicht beregnen.				
Zwiebeln gesteckt	Stomp SC	2 l +	2,5–3 l +	4 l +	Sofort bis 5 Tage nach dem Pflanzen. Nur in handgesteckten Zwiebeln (mind. 3 cm tief).
	+ Molipan Pro	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg	

Anwendung (Fortsetzung)

Kultur	Produkte	Aufwandmenge pro ha			Zeitpunkt / Bemerkungen
		Leichte Böden	Mittlere Böden	Schwere / humose B.	
Feldbau					
Erbsen	Stomp SC +	1 l +	1,5 l +	2 l +	Im Keim- bis 2-Blatt-Stadium der Unkräuter, unabhängig von der Kulturentw.
	Basagran SG	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg	
Kartoffeln	Stomp SC	4 l +	4 l +	5 l +	Sofort nach dem Häufeln bis kurz vor dem Durchstossen. Speziell gegen Nachtschatten und Kreuzkraut.
	+ Molipan Pro	0,4 kg	0,8 kg	1,2 kg	
Wintergetreide (ausser Hafer)	Stomp SC +	2,5 l +	2,5 l +	3 l +	Ab 3-Blatt-Stadium bei Weizen, Gerste, Roggen und Triticale bis Ende Oktober
	Graminon IPU	1,5 kg	2 kg	2 kg	
Wintergerste, Winterroggen, Triticale, Korn	Stomp SC	3 l bei Windhalm/Rispengräsern 4 l bei Ackerfuchsschwanz/Klebern			Nach der Saat bis zum Keimen der Unkräuter. Auf regelmässige Saattiefe von 2–3 cm achten.
Lupinen	Stomp SC	2,5 l	3 l	4 l	Vorauflauf.
Wiesen, Weiden	Stomp SC	4 l	4 l	4 l	Gegen fadenförmigen Ehrenpreis, nach dem letzten Herbstschnitt.
Zierpflanzen					
Pensée, Bellis	Stomp SC		2,5 l	2,5 l	25 ml/a, vor Pikieren oder Auspflanzen.
Sommerflorabatten	Stomp SC		2,5 l	2,5 l	Vor dem Auspflanzen. Nur Topf- und Ballenpflanzen.
Stauden	Stomp SC		4 l	4 l	40 ml/a, vor dem Austrieb.

Wirkungsspektrum

	Stomp SC	Stomp SC + Molipan Pro		Stomp SC	Stomp SC + Molipan Pro
Ackerfuchsschwanz	●/● ¹⁾	●/● ¹⁾	Knöterich, Floh-	●	●
Amarant, Kriechender	●	●	Knöterich, Vogel-	●	●
Amarant, Rauhaariger	●	●	Knöterich, Winden-	●	●
Bingelkraut	●	●	Kreuzkraut	●	●
Ehrenpreis-Arten	●	●	Melden, Ruten-	●	●
Erdrauch	●	●	Mohn	●	●
Franzosenkraut	●	●	Nachtschatten	●	●
Gänsedistel	●	●	Raps, Ausfall-	○	● ³⁾
Gänsefuss	●	●	Rispengräser	●	●
Hederich	○	●	Schaumkraut		●
Hellerkraut	○	●	Senf, Acker-, Gelber	●	●
Hirsen	●	●	Stiefmütterchen	●	●
Hirtentäschel	●	●	Taubnessel	●	●
Hohlzahn (Gluren)	●	●	Vogelmiere	●	●
Hundspetersilie		●	Windhalm	● ¹⁾	● ²⁾
Kamille	● ¹⁾	●	Wolfsmilch	●	●
Klettenlabkraut	● ²⁾	● ²⁾			

● Volle Wirkung ● Teilwirkung ○ Ungenügende Wirkung Leere Felder: bedeutungslos oder ungenügende Erfahrung

1) Nur bis zum Auflaufen erfasst. 2) Im Wintergetreide werden die Herbstkeimer erfasst. 3) Bis zum 2–4-Blatt-Stadium

Fortsetzung auf dem nächsten Blatt →

Stomp[®] sc

Brühezubereitung

Stomp SC vor Gebrauch kräftig schütteln. Spritztank zu $\frac{3}{4}$ mit Wasser füllen. Bei Tankmischungen zuerst Graminon IPU, Basagran SG oder Molipan Pro im Tank auflösen, dann Stomp SC bei laufendem Rührwerk zugeben und auffüllen. Spritzgeräte (inklusive Filter und Leitungen) sofort nach Gebrauch mit Zusatz von Soda oder fettlösendem Reinigungsmittel gründlich reinigen und mit viel Wasser durchspülen. Keine Anwendung von Stomp SC in der Nähe von Reben.

Nachbau

Keine Einschränkungen nach einer normalen Kulturzeit von mindestens 4 Frühjahrs-/Sommermonaten.

Bei vorzeitigem Umbruch nach

Anwendung im Herbst (Getreide):

Nach Pflügen: Bohnen, Erbsen, Fenchel, Karotten, Kartoffeln, Klee, Kohlarten, Mais, Sonnenblumen, Schwarzwurzeln, Zuckerrüben, Zwiebeln. Bei vorzeitigem Umbruch

nach Anwendung im Frühjahr und Sommer:

- Nach Stomp SC allein: Karotten, Sonnenblumen; Setzlinge von Kohlarten, Lauch, Salat und Sellerie.
- Nach Stomp SC + Molipan Pro: Sonnenblumen, Lauch- und Selleriesetzlinge sowie Perser- und Alexandrinerklee. Während der ersten 4 Monate nach der Behandlung dürfen keine Getreidearten, Gräser sowie Mais gesät werden.

Packungsgrößen

1 l (10 x 1 l), 5 l (4 x 5 l)

Marke

® Registered trademark of BASF, Ludwigshafen, Germany

Gefahrenhinweis

N Umweltgefährlich

Version

03/2009