

Ultracid® 40

Kontrolliert ein breites Spektrum von Schädlingen im Gemüsebau und in Kartoffeln

- › **Schützt die Kulturen vor fressenden, saugenden und minierenden Schädlingen**
- › **Lange Wirkungsdauer**
- › **Temperatur-unabhängige Wirkung**

Wirkstoff

40% Methidathion

Formulierung

Pulverförmiges Spritzmittel (WP)

Wirkungsweise

Starkes Kontakt- und Frassgift. Der Wirkstoff dringt in das Pflanzengewebe ein und erfasst ebenfalls saugende und minierende Schädlinge. Ultracid 40 zeigt eine rasche Anfangswirkung und eine lange Wirkungsdauer. Die Wirkung ist temperaturunabhängig.

Wirkungsspektrum

Ultracid 40 erfasst ein breites Spektrum von fressenden und saugenden Insekten.

Anwendung

Gemüsebau

Dosierung: 75 g/100 l

Gegen Raupen an Kohl, Kohlblattlaus und Kohlschabe beim ersten Auftreten behandeln. 0,1% Etalfix Pro zusetzen. Dichte Kohlbestände besonders gründlich spritzen: mit schräg nach hinten gerichteten Düsen in derselben Spur hin- und zurückfahren. Weisse Fliege auf Gurken und Tomaten unter Glas:

Vor der Pflanzung den Übergang vom Boden zur Wand der Glas- oder Plastikhäuser gründlich behandeln. Befallene Kulturen können bis zum ersten Fruchtansatz mit Ultracid 40 behandelt werden. Wartefrist 3 Wochen.

Kartoffeln

Dosierung: 750 g/ha
Gegen Kartoffelkäfer und deren Larven. Behandlung beim ersten Auftreten der Larven. Wartefrist 3 Wochen.

Beachten

Gefährlich für Bienen: Darf nicht mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen (z.B. Kulturen, Einsaaten, Unkräutern, Nachbarkulturen, Hecken) in Kontakt kommen. Blühende Einsaaten oder Unkräuter sind vor der Behandlung zu entfernen (am Vortag mähen/mulchen).

Brühezubereitung

Ultracid 40 mit der 3–5-fachen Menge Wasser anteigen. Das Konzentrat anschliessend unter Rühren in den zu $\frac{3}{4}$ gefüllten Tank giessen. Bei Mischbrühen zuerst Fungizid- oder Akarizidbrühe zubereiten und Tank zu $\frac{3}{4}$ anfüllen; anschliessend Ultracid 40 zugeben und Tank auffüllen.

Mischbarkeit

Ultracid 40 ist mit allen Syngenta-Fungiziden und -Akariziden mischbar. Mischbrühen sind nach der Herstellung sofort zu verwenden.

Packungsgrössen

1 kg (4 Beutel zu 250 g), 10x1 kg

Marke

® Registered trademark of a Syngenta Group Company

Gefahrenhinweise

N Umweltgefährlich
T Giftig

Version

03/2009