



syngenta[®]
SEEDS

**Гибриды
кукурузы**



Среднепоздний гибрид кукурузы

Долар

**Зерно или силос? Вы сами решаете
в любой момент**

ФАО 420 Назначение – зерно, силос

- Благодаря высокорослости и мощной зеленой массе может использоваться на силос
- Очень стабильный и неприхотливый гибрид
- Можно возделывать по экстенсивной технологии
- Зерно зубовидное, отличного качества
- Отличная устойчивость к засухе
- Устойчив к основным патогенам

Упаковка



Посевные единицы

Семена кукурузы
1 п.е. = 1 га.
1 посевная единица = 80 000
семян в мешке. 1 п.е.
приблизительно идет на 1 га.

Отличительные черты гибридов кукурузы

- ♦ Растения идеально выровнены. Початки находятся на одной высоте, что облегчает механизированную уборку
- ♦ Прямостоячие листья образуют большую фотосинтетическую поверхность, что дает возможность делать более загущенный посев
- ♦ Более компактная метелка способствует лучшему притоку пластических веществ при формировании зерна в початке, а также улучшает качество силоса
- ♦ Широкий ассортимент представленных гибридов позволяет выбрать наиболее приемлемые для различных зон и условий выращивания

Краткие рекомендации по возделыванию кукурузы

1. Лучшие предшественники - колосовые культуры и зернобобовые, можно также после кукурузы на зерно. Нецелесообразно размещать после свеклы, подсолнечника, суданской травы.
2. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под вспашку, азотные - весной. Доза внесения - $N_{60-90} P_{60} K_{60}$.
3. Допосевная обработка зависит от физического состояния почвы, наличия пожнивных остатков на поверхности, типа и степени засоренности поля.
4. Оптимальный срок сева кукурузы при температуре почвы +10°C.
5. При посеве кукурузы ширина междурядий 70 см, глубина заделки семян 5-9 см, в зависимости от типа и состояния почвы. Скорость движения сеялки 5-6 км/ч.
6. Норма высева семян от 50 до 90 тыс. на га, в зависимости от зоны возделывания, группы спелости, характеристик гибрида.
7. Довсходовое боронование следует проводить за 3-5 дней до появления проростков кукурузы. Повсходовое боронование проводят при необходимости, в фазе 3-5 листьев на растениях. Глубина хода зубьев борон 4-5 см. Скорость движения агрегата — не выше 4-5 км/ч. Рекомендуется производить во второй половине дня, когда растения теряют тургор. Для уничтожения сорняков в рядах применяют гербициды.
8. Междурядные обработки посевов рекомендуется завершать проведением высокого окучивания растений.
9. Физиологическая спелость у кукурузы обычно наступает через 50-52 дня после стадии выхода рылец, при появлении черного слоя на зерновке.

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Дистрибьютор ТОО «Сингента Казахстан» по Южно-Казахстанской и Джамбульской областям
ТОО «Южный полевод», г. Шымкент, ул. Казыбек би, 78
тел: 8 (7252) 55 05 40; сот.: 8 777 502 42 00 Владислав; 8 777 160 92 92 Алексей

Представитель по продажам семян

Ермагамбетов Агыбай, раб.: +7 (727) 277 78 11, (вн 134); моб.: 8 701 760 7954.

syngenta[®]
SEEDS