



Xn (Nociv)

R22 - NOCIV PRIN ÎNGHIȚIRE
R51/53 - TOXIC PENTRU ORGANISMELE
ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE
ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA
MEDIULUI ACVATIC
R63 - POSIBIL RISC DE EFECTE DĂUNĂTOARE
ASUPRA COPILULUI NENĂSCUT, ÎN TIMPUL
SARCINII



N (Periculos
pentru mediu)

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR
S13 - A SE PĂSTRA DEPARTE DE ALIMENTE,
BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE
S20/21 - ESTE INTERZIS CONSUMUL DE
ALIMENTE ȘI DE BĂUTURI, PRECUM ȘI
FUMATUL ÎN TIMPUL UTILIZĂRII
S35 - A SE ELIMINA REZIDUURILE
PRODUSULUI ȘI AMBALAJUL (RECIPIENTUL)
DUPĂ CE S-AU LUAT TOATE MĂSURILE DE
PRECAUȚIE
S36/37 - A SE PURTA ECHIPAMENT DE
PROTECȚIE ȘI MĂNUȘI DE PROTECȚIE
CORESPUNZĂTOARE
S57 - A SE UTILIZA UN AMBALAJ (RECIPIENT)
CORESPUNZĂTOR PENTRU EVITAREA
CONTAMINĂRII MEDIULUI
SP1 - A NU SE CONTAMINA APA CU
PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU;
A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE
DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE
SUPRAFAȚĂ
SPE3 - PENTRU PROTECȚIA ORGANISMELOR
ACVATICE RESPECTAȚI O ZONĂ TAMPON
NETRATATĂ DE 15 M PÂNĂ LA APA DE
SUPRAFAȚĂ

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ. Culturile omologate: grâu, orz, rapiță, floarea soarelui. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înainte folosirii produsului.

PPE277517

L140747 ROMANIA 1 L

Amistar Xtra

280 SC

Deținătorul omologării: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Importator: Syngenta Agro SRL, București, Victoria Park, Str. București-Ploiești nr 73-81, etaj 4, tel. 021-528.12.00; tel. urgență: 021-529.25.77; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77

Substanță activă: 200 g/l (18,2% w/w) azoxistrobin + 80 g/l (7,3% w/w) ciproconazol

Denumirile substanțelor periculoase ce trebuie menționate pe etichetă: azoxistrobin și ciproconazol

Formulare: Suspensie concentrată **AREA**

Fungicid
95 MM X 119 MM

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2283 / 28.10.2004.

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației, păstrat în ambalaje originale, închise etanș.

Depozitare: Se va păstra la adăpost de căldură și umezeală. Temperatura de depozitare între -10°C și +35°C.

Lot număr* } Se va imprima separat
Data fabricației* }

Numele produselor marcate cu ® sau ™, sigla SYNGENTA și chenarul alăturat sunt mărci ale unor companii din grupul Syngenta

1 litru e

syngenta®

În caz de urgență contactați:
Syngenta Agro SRL, București -
Serviciul de urgență:
Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau
Syngenta Alarm Centre
Huddersfield, Anglia:
Tel.: +44 1484 538 444
Fax: +44 1484 433 197

MAXIMUM TYPE AREA
58 MM X 119 MM

Măsuri de protecția mediului: Deoarece produsul este toxic pentru organismele acvatice, în tehnologiile și instrucțiunile de utilizare se vor înscrie măsurile obligatorii de respectat pentru protecția apelor, conform prevederilor legale. Nu se vor contamina râurile, eleșteele, apa de irigație sau alte acumulări de ape. Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Să se prevină prin orice măsură ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

Eliminarea ambalajelor goale: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriei de Protecție a Plantelor din România - SCAPA. Ambalajele colectate prin acest program sunt inscripționate cu sigla SCAPA.

Sunați la tel. 0800.872.272, sau consultați site-ul www.aiprom.ro, Agenția Județeană de Protecție a Mediului sau distribuitorii locali pentru informații despre cel mai apropiat punct de colectare și calendarul de lucru al SCAPA.

Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Condiții de depozitare și transport: Produsul se depozitează în ambalajul original,

sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, fără acțiunea directă a razelor solare și căldurii. Transportul se efectuează ferit de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării și transportului se iau obligatoriu toate măsurile de protecția muncii, PSI. Temperatura de depozitare va fi între -10°C și +35°C. Se va feri de surse de căldură.

PAGE 7

Măsuri de prevenire și stingerea incendiilor
Se vor lua măsurile specifice de prevenirea și stingerea incendiilor provocate prin inflamarea pesticidelor. Ambalajele expuse la foc se vor menține reci prin stropire cu apă. Pentru incendii mici se va folosi ca agent de stingere: spumă, dioxid de carbon sau pudră. Pentru incendii mari se va folosi spumă sau ceață de apă; evitați folosirea jeturilor de apă. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apelor sau solului cu agentul folosit la stingerea incendiului, de exemplu: folosirea de baraje temporare din pământ. Gazele de combustie sunt toxice și iritante. A se purta echipament specific și aparat de respirat individual.

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației, în condițiile de depozitare menționate mai sus.

În atenția utilizatorului
Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele

daune provocate de incorectă manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice a produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismelor rezistente.

Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total. Relații suplimentare se pot obține de la Unițile Fitosanitare Județene sau Syngenta Agro SRL, București, tel: +(40 21) 528 12 00.

© 2009 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați:
Syngenta Agro SRL, București -
Serviciul de urgență:

Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau
Syngenta Alarm Centre,
Huddersfield, Anglia:
Tel.: +44 1484 538 444;
Fax: +44 1484 433 197

Amistar Xtra

280 SC



Xn (Nociv)



N (Periculos pentru mediu)



SCAPA

R22 - NOCIV PRIN ÎNGHIȚIRE
R51/53 - TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC
R63 - POSIBIL RISC DE EFECTE DĂUNĂTOARE ASUPRA COPILULUI NENĂSCUT, ÎN TIMPUL SARCIINII

MAXIMUM TYPE AREA

81mm x 117mm

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPILOR
S13 - A SE PĂSTRA DEPARTE DE ALIMENTE, BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE
S20/21 - ESTE INTERZIS CONSUMUL DE ALIMENTE ȘI DE BĂUTURI, PRECUM ȘI FUMATUL ÎN TIMPUL UTILIZĂRII
S35 - A SE ELIMINA REZIDUURILE PRODUSULUI ȘI AMBALAJUL (RECIPIENTUL) DUPĂ CE S-AU LUAT TOATE MĂSURILE DE PRECAUȚIE
S36/37 - A SE PURTA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI MĂNUȘI DE PROTECȚIE CORESPUNZĂTOARE
S57 - A SE UTILIZA UN AMBALAJ (RECIPIENT) CORESPUNZĂTOR PENTRU EVITAREA CONTAMINĂRII MEDIULUI
SP1 - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ
SPE3 - PENTRU PROTECȚIA ORGANISMELOR ACVATICE RESPECTAȚI O ZONĂ TAMPON NETRĂTĂ DE 15 M PÂNĂ LA APA DE SUPRAFAȚĂ

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE.
PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ.
Culturile omologate: grâu, orz, rapiță, floarea soarelui. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului.

750ml

500ml

250ml

approx. measure

Deținătorul omologării: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Importator: Syngenta Agro SRL, București, Victoria Park, Str. București-Ploiești nr 73-81, etaj 4, tel. 021-528.12.00; tel. urgență: 021-529.25.77; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77

Substanță activă: 200 g/l (18,2 % w/w) azoxistrobin+ 80 g/l (7,3 % w/w) ciproconazol

Denumirile substanțelor periculoase ce trebuie menționate pe etichetă: azoxistrobin și ciproconazol

Formulare: Suspensie concentrată

Fungicid

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2283 / 28.10.2004.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

Proprietăți fizico-chimice: Amistar Xtra 280 SC se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendință de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen, de culoare galbenă. Conține: 200 g/l azoxistrobin + 80 g/l ciproconazol.

Timp de pauză: După aplicarea ultimului tratament și recoltare trebuie să treacă minim 35 zile pentru grâu și orz, 21 zile pentru rapiță.

Mod de acțiune: Amistar Xtra 280 SC este un fungicid cu două substanțe active: Azoxistrobin și ciproconazol. Azoxistrobin face parte din grupa strobilurinelor, are un spectru larg de acțiune împotriva bolilor foliare la cereale și rapiță. În celulele agenților patogeni, azoxi-

strobin blochează transportul electronilor în mitocondrie. Ciproconazol face parte din grupa triazolilor și blochează sinteza ergosterolilor. Amistar Xtra 280 SC are în principal proprietăți preventive, dar și curative. Pentru rezultate optime tratamentul se va efectua preventiv sau imediat ce primele simptome de boală au apărut.

Amistar Xtra 280 SC asigură o protecție a culturii de 3-5 săptămâni. Cultura rămâne verde mai mult timp ceea ce determină o mai lungă perioadă de asimilare, cu influențe favorabile în cantitatea și calitatea recoltei.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

În România, produsul este omologat la:

Cultură	Dăunători	Doză
Grâu	Boli foliare și ale spicului: făinare (<i>Erysiphe graminis</i>), rugină (<i>Puccinia</i> spp.), septorioză (<i>Septoria</i> spp.), fuzarioză (<i>Fusarium</i> spp.), sfâșierea frunzelor (<i>Helminthosporium</i> spp.)	0,5 l/ha
Orz	Boli foliare: făinare (<i>Erysiphe graminis</i>), pătarea rețiculară brună (<i>Pyrenophora teres</i>), arșura frunzelor de seară (<i>Rhynchosporium secalis</i>), sfâșierea frunzelor (<i>Helminthosporium sativum</i>)	0,75 l/ha
Rapiță	Putregaiul uscat al verzei (<i>Phoma lingam</i>), putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>), pătarea neagră a frunzelor (<i>Alternaria brassicae</i>), făinare (<i>Erysiphe communis</i>)	0,75 l/ha
Hoarea soarelui	putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>) frângerea tulpinilor (<i>Phomopsis helianthi</i>), alternarioză (<i>Alternaria</i> spp.) (2 tratamente în vegetație)	0,75 l/ha

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Recomandări de aplicare:

Grâu: În cazul tehnologiei de protecție cu un singur tratament pe sezon, se recomandă aplicarea produsului Amistar Xtra 280 SC la apariția primelor simptome de boală. În cazul tehnologiei cu două tratamente pe sezon, primul tratament se aplică cu un produs cu substanță activă din grupa triazolilor până în faza de al doilea-treilea internod al culturii (stadiul 32-33), urmat de un tratament cu Amistar Xtra 280 SC care se aplică de la apariția frunzei stindard (41-47 BBCH) până la înflorire-înflorire (51-61 BBCH).

Orz: Se aplică un singur tratament cu Amistar Xtra 280 SC, la apariția primelor simptome de boală.

Rapiță: tratamentele se vor efectua în primăvară, preventiv, la începutul/mijlocul înfloriturii, în condiții favorabile dezvoltării bolilor sau conform avertizărilor locale.

Pregătirea soluției: Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește sistemul de agitare și se adaugă cantitatea măsurată de Amistar Xtra 280 SC. Se completează cu restul de apă. Se menține sistemul de agitare în funcțiune pe toată durata tratamentului. Amistar Xtra 280 SC se poate aplica cu

echipament terestru sau aerian într-un volum normal de apă specific fiecărui echipament.

Compatibilitatea: Amistar Xtra 280 SC este compatibil cu numeroase produse de uz fito-sanitar. Înainte de utilizare se va consulta tabelul de compatibilități și se va efectua un test pe cultura respectivă.

Măsuri de igienă și protecția muncii: Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca.

Primul ajutor: În caz de contact cu ochii, aceștia se vor spăla imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Se va consulta medicul.

În caz de contact cu pielea: Se vor îndepărta hainele contaminate. Se va spăla imediat pielea cu apă sau apă și săpun. Se va consulta medicul.

În caz de inhalare: Se va muta persoana din mediul toxic la aer curat, se va ține la căldură și fără efort. Se va consulta medicul.

În caz de ingestie: Se va consulta imediat un medic. Nu se va provoca vomă.

Sfat medical: Nu există antidot specific disponibil; se va efectua un tratament simptomatic.