

Callisto 480 SC + MISTRAL[®] 4 SC

Callisto[®]

MAX

Pachet tehnologic pentru combaterea buruienilor la cultura porumbului

Conține

Callisto 480 SC – 1 litru, în ambalaj de 1 litru
Mistral 4 SC – 5 litri, în ambalaj de 5 litri

Prepararea amestecului: Se umple jumătate cu apă rezervorul, se adaugă cantitatea necesară de Callisto 480 SC și se agită; se adaugă apoi cantitatea necesară de Mistral 4 SC, restul de apă și se agită 10 minute pe loc, cât și pe tot timpul aplicării soluției de erbicidat.
Notă: Înainte de folosirea produselor, consultați și etichetele ambalajelor individuale. Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produselor, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestora. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din aceste etichete.

Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total.

Pentru informații suplimentare adresați-vă la: Syngenta Agro SRL, București, Str. Johann Strauss nr. 2 A, tel.: 021-231.94.99; tel. de urgență: 021-231.95.77

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Importator: Syngenta Agro SRL, București, Str. Johann Strauss nr. 2 A, tel.: 021-231.94.99; tel. de urgență: 021-231.95.77



Pentru
3 ha

Spectru de combatere: Aplicat conform recomandărilor, pachetul tehnologic Callisto Max combate un spectru larg de buruieni din cultura de porumb, inclusiv costreii (*Sorghum halepense*) din rizomi.

Pentru lista completă a buruienilor combătute, consultați etichetele produselor componente de pe fiecare ambalaj.

Se va evita aplicarea pachetului tehnologic Callisto Max în cazul în care buruiiana predominantă este iarba bărboasă (*Echinochloa crus-galli*), după ce aceasta a depășit stadiul de 3-4 frunze - înfrățire.

Mod de aplicare: Pachetul tehnologic Callisto Max se aplică la cultura de porumb în postemergență când buruienile sunt răsărite. Pachetul tehnologic Callisto MAX poate fi aplicat fără restricții până la stadiul de 8 frunze al culturii de porumb.

Pentru efect optim asupra buruienilor, se recomandă ca acestea să nu depășească la momentul aplicării:

- 20 cm înălțime pentru buruienile graminee perene (costrei) sau
- stadiul de 6 frunze la buruienile cu frunză lată (unele din acestea, cum ar fi: cornaciul, ciumăfaia, teișorul, inclusiv pălămida, fiind sensibile chiar în stadii mai avansate).

Doze de utilizare: Pachetul tehnologic Callisto MAX se aplică astfel: 1,5 litri lha Mistral 4 SC + 0,33 litri lha Callisto 480 SC.

syngenta[®]

Callisto 480 SC + MISTRAL[®] 4 SC

Callisto[®]
MAX

Pachet tehnologic pentru combaterea buruienilor la cultura porumbului

Deținătorul omologării: Syngenta Limited, Anglia.

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Importator: Syngenta Agro SRL, București, Str. Johann Strauss nr. 2 A, tel.: 021-231.94.99; tel. urgență: 021-231.95.77

Substanță activă: 480 g/l mesotrione

Erbicid pentru combaterea buruienilor la porumb

Formulare: Suspensie concentrată

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2156/11.10.2002

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricării, păstrat în ambalajele originale, închise etanș.

Depozitare: Se va păstra la adăpost de căldură și umezeală, departe de alimente și furaje.

Temperatura de depozitare între +5°C și +35°C.

Deținătorul omologării: Syngenta Limited, Anglia.

Producător: Syngenta Limited, Anglia.

Importator: Syngenta Agro SRL, București, Str. Johann Strauss nr. 2 A, tel.: 021-231.94.99; tel. urgență: 021-231.95.77

Substanță activă: nicosulfuron 40 g/l

Erbicid pentru combaterea buruienilor la porumb

Formulare: Suspensie concentrată

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 1321/13.03.1992

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației, păstrat în ambalaje originale, închise etanș.

Depozitare: Se va păstra la adăpost de căldură și umezeală. Temperatura de depozitare între 0 și 35°C.



N (Periculos pentru mediu)



Xi (Iritant)



N (Periculos pentru mediu)

R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC

R38 - IRITANT PENTRU PIELE
R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC

MĂSURI DE SIGURANȚĂ: DEPOZITAREA:

S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR;

S13 - A SE PĂSTRA DEPARTE DE ALIMENTE, BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE

PROTECȚIA OPERATORULUI:

S20/21 - ESTE INTERZIS CONSUMUL DE ALIMENTE ȘI DE BĂUTURI, PREȚUM ȘI FUMATUL, ÎN TIMPUL UTILIZĂRII;

S28 - LA CONTACTUL CU PIELEA, SE SPALĂ IMEDIAT CU MULTĂ APĂ;

S36/37 - A SE PURTA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI MĂNUȘI DE PROTECȚIE CORESPUNZĂTOARE;

S46 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE, A SE CONSULTA IMEDIAT MEDICUL ȘI A SE I ARĂTA AMBALAJUL (RECIPIENTUL) SAU ETICHETA

PROTECȚIA MEDIULUI; S35 - A SE ELIMINA REZIDUURILE PRODUSULUI ȘI AMBALAJUL (RECIPIENTUL) DUPĂ CE S-AU LUAT TOATE MĂSURILE DE PRECAUȚIE;

S57 - A SE UTILIZA UN AMBALAJ (RECIPIENT) CORESPUNZĂTOR PENTRU EVITAREA CONTAMINĂRII MEDIULUI; SP1 - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA

ECHIPAMENTELE DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ;

SPE3 - PENTRU PROTECȚIA ORGANISMELOR ACVATICE RESPECTAȚI

O ZONĂ TAMPON NETRATATĂ DE 15 M PÂNĂ LA APA DE SUPRAFAȚĂ

În caz de urgență contactați: Syngenta Agro SRL, București -

Serviciul de urgență, Tel.: +(40 21) 231 95 77 sau Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia, Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 433 197

syngenta[®]