

PPE27244T

L13921T ROMANIA

GARDOPRIM® PLUS GOLD

500 SC

Deținătorul omologării: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Importator: Syngenta Agro SRL, București, Victoria Park,

Str. București-Ploiești nr 73-81, etaj 4, tel. 021-528.12.00;

tel urgență: 021-529.25.77; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77

Substanță activă: 312,5 g/l S-metolaclor + 187,5 g/l terbutilazin

Substanțe chimice periculoase conținute: S-metolaclor

Formulare: Suspensie concentrată

Erbicid

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr.
2158/11.10.2002

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației, păstrat în ambalajele originale.



Xi (Iritant)



N (Periculoș
pentru mediu)

R36 - IRIANT PENTRU OCHI

R43 - POATE PROVOCA SENSIBILIZARE ÎN CONTACT CU PIELEA
R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE,
POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA
MEDIULUI ACVATIC

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR;

S13 - A SE PĂSTRA DEPARTE DE ALIMENTE, BĂUTURI ȘI HRANĂ
PENTRU ANIMALE;

S20/21 - ESTE INTERZIS CONSUMUL DE ALIMENTE ȘI DE BĂUTURI,
PRECUM ȘI FUMATUL ÎN TIMPUL UTILIZĂRII;

S23 - A NU ÎNSPIRA GAZUL / FUMUL / VAPORII / AEROSOLII;

S24 - A SE EVITA CONTACTUL CU PIELEA;

S26 - LA CONTACTUL CU OCHII, SE SPALĂ ÎMEDIAT CU MULTĂ APĂ
ȘI SE CONSULTA MEDICUL;

S37 - A SE PURTA MĂNUȘI DE PROTECȚIE CORESPUNZĂTOARE;

SP1 - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU

AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE DE APLICARE
ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR
RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE.

PENTRU UTILIZARE NUMAI CA ERBICID ÎN AGRICULTURĂ.

Culturile omologate: porumb, floarea-soarelui. Citiți toate celelalte măsuri de
siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului.

neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora.

A nu se împrăștiă produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Purtați echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare. Produsul este iritant. După lucru, curați bine echipamentul de protecție, spălați tot corpul și schimbați îmbrăcămintea. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire.

Interval de reintrare: Nu intrați în zonele tratate până când soluția de pe suprafața frunzelor nu s-a uscat.

Primul ajutor

Recomandare: Să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de securitate atunci când sunați la numărul de urgență Syngenta sau la medic, sau când mergeți pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apelați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați imediat la medic.

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat.

Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirația artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Apelați imediat la medic sau la serviciile medicale.

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. Nu se va provoca vomă.

Sfat medical: nu există disponibil un antidot specific; se va efectua un tratament simptomatic.

În caz de urgență contactați: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de urgență: Tel.: +(40 21) 231 95 77 sau Syngenta Alarm Centre,

Huddersfield, Anglia: Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 433 197.

Mediul înconjurător și animalele sălbatice: Deoarece produsul este foarte toxic față de organismele acvatice, în tehnologiile și în instrucțiunile de utilizare, se vor specifica măsurile pentru protecția apelor de suprafață. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu contaminați apa folosită pentru irigații sau în scopuri domestice, eleștele, șanțurile, lacurile, sistemele de drenare etc. cu reziduuri. În zonele nou tratate nu vor fi lăsate animale la păscut.

Scurgeri: Colectați produsul împrăștiat și depuneți-l într-un loc permis pentru deșeuri de pesticide. **Notă:** Produsul revărsat nu se va refolosi.

Eliminarea ambalajelor goale: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit (pentru produse lichide). Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriei de Protecție a Plantelor din România- SCAPA.

Ambalajele colectate prin acest program sunt inscripționate cu sigla SCAPA.

Sunați la telefon 0800.872.272, sau consultați site-ul www.aiprom.ro, Agenția Județeană de Protecție a Mediu sau distribuitorii locali pentru informații despre cel mai apropiat punct de colectare și calendarul de lucru al SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Condiții de depozitare și transport

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fără acțiunea directă a razelor solare și căldurii. Transportul se efectuează ferit de intemperii și căldură. În timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI, etc.

Temperatura de depozitare între -10°C și 35°C.

Nu suprapuneți containerele mai mult de 2 m înălțime, pentru a evita compactarea sau deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate: Produsul este valabil 3 ani de la data fabricației, în condiții de depozitare menționate mai sus.

În atenția utilizatorului: Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice ale produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismelor rezistente.

Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total.

Relații suplimentare se pot obține de la Unitățile Fitosanitare Județene sau Syngenta Agro SRL, București, tel.: +(40 21) 528 12 00.

© Marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta

© 2008 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 433 197

PPE272441

L139211 ROMA/10L

GARDOPRIM® PLUS GOLD
500 SC

Deținătorul omologării: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Importator: Syngenta Agro SRL, București, Victoia Park,

Str. București-Floiești nr 73-81, etaj 4, tel. 021-528.12.00;

tel urgență: 021-529.25.77; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77

Substanță activă: 312,5 g/l S-metolador + 187,5 g/l terbutilazin

Substanțe chimice periculoase conținute: S-metolador

Formulare: Suspensie concentrată

Erbicid

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2158/11.10.2002

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației, păstrat în ambalajele originale.



Xi (Iritant)



N (Periculos pentru mediu)

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. PENTRU UTILIZARE NUMAI CA ERBICID ÎN AGRICULTURĂ.
Culturi omologate: porumb, floarea-soarelui.
Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înainte folosirii produsului.

Numele produselor marcate cu © sau ™, sigla SYNGENTA și chenarul alăturat sunt mărci ale unor companii din grupul Syngenta

5 litri e

syngenta®



Proprietăți fizico-chimice

Gardoprim Plus Gold se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendință de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen, de culoare albă. Conține 312,5 g/l S-metolacilor + 187,5 g/l terbutilazin. Nu este coroziv.

Mod de acțiune

S-metolacilor este, în principal, preluat de buruieni în timpul germinării semințelor prin coleoptil sau tânără plantă. Prin urmare, buruienile sunt combătute înainte de răsărire, în timpul sau la scurt timp după răsărire.

Terbutilazin este preluat de buruieni prin rădăcini și frunze.

Spectrul de acțiune

Gardoprim Plus Gold 500 SC este activ împotriva majorității buruienilor anuale monocotile și dicotile.

Buruieni sensibile

Amaranthus spp.	Polygonum aviculare
Anagallis arvensis	Polygonum persicaria
Capsella bursa-pastoris	Portulaca oleraceae
Chenopodium spp.	Setaria glauca
Datura ferox	Setaria viridis
Datura stramonium	Senecio vulgaris
Digitaria sanguinalis	Solanum nigrum
Echinochloa crus-galli	Stachys spp.
Fumaria officinalis	Stellaria media
Galeopsis tetrahit	Thlaspi arvense
Lamium spp.	Veronica spp.
Matricaria spp.	Vicia spp.
Panicum dichotomiflorum	Viola tricolor
Panicum miliaceum	

Buruieni moderat sensibile

Abutilon theophrasti	Ranunculus spp.
Atriplex spp.	Sinapis spp. **
Hibiscus trionum	Solanum nigrum **
Galium aparine	Sonchus oleracea
Linaria spp.	Sorghum bicolor
Malva neglecta	Sorghum halepense *
Plantago spp.	Xanthium spp. **

*din semințe; **tratament postemergent timpuriu.

Mod de întrebuințare: În România produsul este omologat la:

Cultura	Buruieni	Doza
Porumb	Buruieni anuale, exclusiv dicotiledonate rezistente (Sinapis, Raphanus, Xanthium)	4 - 5 l/ha (funcție de tipul de sol), preemergent
Porumb	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale, inclusiv speciile dicotiledonate anuale, rezistente la tratamente preemergente: Xanthium, Solanum, Sinapis, Abutilon	4 - 4,5 l/ha (funcție de nivelul de infestare și dominanța buruienilor) postemergent timpuriu (porumb 3-4 frunze, buruienile în stadii mici 2, maxim 4 frunzulițe)
Floarea-soarelui	Buruieni anuale (excepție Xanthium, Solanum, Sinapsis)	3,5-4,0 l/ha (în funcție de tipul de sol), preemergent

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri între orele 08:00-18:00.

Observații:

Folosiți doza mai mare pe soluri mai grele sau cu infestare puternică cu buruieni. Eficacitatea optimă a tratamentului se obține în condițiile de pregătire bună a patului germinativ, fără bulgări, bine mărunțit în primăvară, după arătura de toamnă.

Momentul aplicării

Gardoprim Plus Gold 500 SC se poate aplica:

- la porumb:

- preemergent, după semănat, dar înainte de răsărire a culturii;
- postemergent timpuriu: porumb 3-4 frunze, buruienile în stadii mici 2, maxim 4 frunzulițe.

- la floarea-soarelui:

- preemergent, după semănat, dar înainte de răsărire a culturii (nu aplicați Gardoprim Plus Gold 500 SC după răsărire a culturii de floarea-soarelui).

Notă:

Se va evita deriva produsului pe culturile învecinate sensibile.

Tehnică/parametrii de aplicare

Echipament de stropit

Pentru aplicarea de Gardoprim Plus Gold 500 SC, se recomandă echipamente de stropit pe tractor, vermorele și stropiri aero. Nu stropiți dacă viteza vântului depășește 5 m/s.

Toate echipamentele de stropit trebuie bine calibrate înainte de folosire privind viteza, doza de scurgere și distribuția uniformă.

Volumul optim pentru echipamentele de stropit pe tractor este de 200-400 l/ha. Folosiți duze plate evantai 110°, la o presiune de 1.5-3 bar și o înălțime de 40-50 cm.

Pentru vermorele se recomandă duze jet cu un volum de minimum 80 l/ha. Lancea de stropit trebuie ținută nemișcată. Nu balansați lancea.

La stropirile aero folosiți numai duze în evantai și pe bară. Duzele

trebuie să aibă un unghi de stropire de 65°-90° și să fie direcționate dependent de direcția de zbor cu 180-135° în spate. Cele mai bune volume de stropit sunt de 20-50 l/ha. Nu se recomandă atomizatoarele rotative. Nu stropiți dacă temperatura depășește 30°C sau dacă umiditatea relativă este sub 60%.

Pregătirea amestecului

Asigurați-vă că rezervorul este curat și necontaminat. Calculați cu atenție cantitatea de amestec de stropit pentru a nu rămâne amestec în rezervor după tratamente.

Umpleți 1/4-1/2 din rezervor cu apă curată, începeți agitarea, adăugați cantitatea de produs calculată și măsurată și continuați să umpleți rezervorul, agitând amestecul. Continuați agitarea în timpul amestecării și aplicării pentru a se obține un amestec de stropit uniform.

Clătiți containerele goale de 3 ori și adăugați soluția rezultată amestecului din rezervor.

Curățați temeinic cu apă curată instalația de stropit după aplicare sau la sfârșitul zilei. Curățați și filtrele.

Compatibilitate

Gardoprim Plus Gold 500 SC poate fi amestecat în rezervor cu alte erbicide folosite la culturile respective. Gardoprim Plus Gold 500 SC poate fi amestecat și cu fertilizatori. Înainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilități și se va efectua un test pe cultura respectivă.

Măsuri de igienă și protecția muncii: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și șapun fără a se freca.

A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor sau a altor persoane