

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj no. :
Fiyat tasdik tarih ve no :

İlacın özellikleri ve etki şekli :

Actara 25 WG ilacının etkili maddesi "thiamethoxam" zararlılara hem temas ve hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir ilaç olup, böceklerin sinir sistemi üzerinde tesirlidir. Bitki aksamı tarafından alınan etkili madde süratle kotiledont taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR :

Kültür Bitkisi	Zararlı	Kullanma dozu	Son ilaçlama ile hasat arası süre
Fındık	Fındık kurdu (<i>Curculio nucum</i>)	20 g/ da (10 g / 100 l su)	7 gün
Antep-fıstığı	Yaprak psillası (<i>Agonoscaena pistaciae</i>)	10 g / 100 l su	7 gün
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	25 g / 100 l su	14 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde edildüğinden emin olunuz. Ağaç başına kullanılacak ilaç su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek ağaç başına kullanılacak ilaç su miktarı hesaplanır.

İlacın hazırlanması ve kullanılması

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptaki su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir.

Not: Actara 25 WG depo karışımı olarak kullanılacaksa, Actara 25 WG 'den önce "Suda erir ambalajlı" (WSB) ilaçlar aletin deposuna konur. Ambalajlar tamamen erir, ilaçlar çözülür. Sonra Actara 25 WG tanka ilave edilir.

KULLANIM ŞEKLİ :

Fındıkta fındık kurdu : 10 ocakta toplam 2'den fazla ergin böcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığında yaprak psillası: İlaçlamaya bileşik yapraklarda 20-30 nimf görüldüğünde başlanmalıdır. Faydalı böceklerin en fazla olduğu Temmuz-Ağustos aylarında Antep fıstığı bahçelerinde ilaç atılmamasına özen gösterilmelidir.

Armutta armut psillidi : İlaçlama, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp iki veya üçüncü dönem nimflerin görülmeye başladığında ve sürgünlerin % 15'inden fazlasında bulaşma görüldüğünde yapılmalıdır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Bitki tahammülü:

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU : Actara 25 WG yaygın olarak kullanılan birçok ilaçla karışım halinde kullanılabilir. Ancak tüm ilaçlarla karışım durumu bilinmediğinden tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
İLAÇ VE GİDALAR KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Durah KOÇAR
Genel Müd. Yrd.

04 Haziran 2009

syngenta

Actara® 25 WG

syngenta

İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)

İslanabilir Granül (WG)

% 25 thiamethoxam : 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl-(5-methyl-1,3,5)-oxadiazinan-4-ylidene (nitro) amine

Siçanlarda akut oral LD₅₀ : 1563 mg/kg

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS

ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK

KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ,

SİGARA İÇMEYİNİZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN

SOKMAYINIZ

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLYARDIM TEDBİRLERİ : Zehirlenmeden şüpheleniliyorsa derhal işi bırakınız, doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini yanınızda bulundurunuz. Şayet ilaç yutulmuşsa ve hasta baygın değilse kusturunuz. Belirtilere göre tedavi uygulayınız. Baygın hastaya ağızdan hiçbir şey verilmez.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.

Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezini arayınız (UZEM):114



Net ve Brüt ağırlığı:

Azami perakende satış fiyatı:

Ruhsat tarih ve no : 21.06.2004 / 4722

**AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE
EMNİYET TEDBİRLERİNİ
OKUYUNUZ**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

Balıkla ve arılara zehirlidir. Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz. Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzak tutulmalıdır.

Kazaen cilt ve iş elbiselerine değen ilaçlı mahlulü hemen yıkayarak uzaklaştırınız. İş bittikten sonra elbiselerinizi değiştirip, ilaca maruz kalan kısımlarınızı sabunlu su ile iyice yıkayınız. Bol su ile gözleri çalkalayınız. Tekrar kullanmadan önce iş elbiselerinizi yıkayınız. İlaçlama sırasında ve ilaçlama bittikten sonra elinizi, yüzünüzü bol su ile yıkamadan, gerekli temizliği yapmadan yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

İlacı serin ve kuru yerlerde, kilit altında, orijinal ambalajında ağız kapalı olarak çocuklardan, yem ve gıda maddelerinden uzak yerlerde muhafaza ediniz. 0° C'nin altında +35° C'nin üzerinde depolamayınız. Normal şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında fiziki ve kimyevi vasıflarını asgari 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

Syngenta Crop Protection AG, Basle, İsviçre
İTHALATÇI FİRMA :
Syngenta Tarım San. ve Tic. AŞ
Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak No:11
35100 Bornova / İzmir
Telefon : 0 (232) 413 00 55

© Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır.

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dr. Ahmet ERÇİS
Sakarya Biki Koruma
Büro Müdürü