

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj no. :
Fiyat Tasdik Tarih No.:

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile hasat arası süre
Narenciye	Pas böcüsü (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>) Yaprak galeri güvesi (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	25 ml/100 l su 25 ml/100 l su	7 gün 7 gün
Süs bitkileri	Galeri sineği (<i>Lyriomyza trifolii</i>)	25 ml/100 l su	-
Domates	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/da	3 gün
Pamuk	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/ da	21 gün
Biber (Sera)	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	25 ml/100 l su	3 gün
Hiyar (Sera)	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	25 ml/100 l su	3 gün
Çilek	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su	3 gün
Patlıcan (Sera)	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su	3 gün

1) İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Ağaç başına veya dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli sayıda ağaç veya belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek ağaç başına veya dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve bir kaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

2) KULLANIM ŞEKLİ :

Narenciye: İlaçlama Pas böcüsü kesafeti görülür görülmez yapılmalıdır. İyi bir mücadele için kaplama ilaçlama şarttır. Ağaç başına 10 – 20 l ilaçlı sıvı yeterlidir. % 0,25 oranında yazlık yağlarla karıştırılabilir. Galerî güvesi için taze sürgünde bulaşma tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanıp, yeni bulaşmalara göre 10-15 gün ara ile tekrarlanır.

DEVAMI ARKA SAYFADA

syngenta

Agrimec® EC
syngenta

İNSEKTİSİT-AKARİSİT
Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı

Emülsiyon Konsantrane

Litrede 18 g Abamectin ihtiva eder.
min. %80 Avermectin B₁ a= Avermectin A₁ a 5-0 demethyl
max. %20 Avermectin B₁ b= Avermectin A₁ a 5-0 demethyl -25- de(1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)

Siçanlarda akut oral LD₅₀ : 10 mg/kg



ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELĐVEN, SİPERLİK,
GÖZLÜK KULLANINIZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS
ETMEYİNİZ
İLAÇLAMA SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ,
SİGARA İÇMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVAN
SOKMAYINIZ

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Göz bebeklerinde büyüme, adalelerde konsantrasyon bozukluğu ve kaslarda kasilmaya neden olur.

Net ve Brüt Ağırlığı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :
Ruhsat Tarih ve No :11.03.1991/2428

**AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ
OKUYUNUZ**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız
- İlaç yanabilir özellikte olduğundan ateşten uzak tutunuz.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız. İlaçlı mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Son ilaçlama ile hasat arası süreye mutlaka uyunuz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz. Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpiniz, sonra süpürüp toplayınız ve imha ediniz.
- İlacı kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- İlacın deri, göz ve elbiselere bulaşmasından kaçınınız
- Gözlük, maske kullanın, kimyasallara dayanıklı eldiven, tulum ve çizme giyiniz
- Ağzınızı ve burnunuzu içine alan maske takınız.
- İlaç gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine bakınız
- İlaç buharlarını solumayınız.
- Kullanılmayan ilacı ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalarda uzakta, kilit altında saklayınız.
- Yıkayınız. İş elbiselerinizi değiştiriniz ve yıkayınız.
- Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

*İlacı, orjinal ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.
* + 35 °C nin üzerinde ve -5 °C nin altında depolamayınız.
*İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orjinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

YANICIDIR

FİRMA BEYANI

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

29 Nisan 2008

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü
SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Süs bitkileri: İlk galeri belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün olmalıdır.

Biber ve Pamuk: Yaprak başına ortalama 1- 3 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Domates, Hıyar ve Patıcan : Yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Çilek : Hareketli dönemde yaprakçık başına ortalama 10 veya üzerinde kırmızı örümcek tespit edildiğinde ilaçlamaya karar verilir.

Bitki tahammülü : Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

3) KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karışabilirlik durumu test edilmelidir. İlaçlara karşı oluşacak mukavemet nedeniyle, farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılmasını icap eden programlarda tavsiye edilmektedir

syngenta

Agrimec® **EC**

syngenta

İNSEKTİSİT-AKARİSİT
Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı

Emülsiyon Konsantre

Litrede 18 g Abamectin ihtiva eder.
min. %80 Avermectin B₁ a= Avermectin A₁ a 5-0 demethyl
max. %20 Avermectin B₁ b= Avermectin A₁ a 5-0 demethyl -25- de(1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)

Siçanlarda akut oral LD₅₀ : 10 mg/kg

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Göze teması halinde: En az 15 dakika bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi önlem alınız.

Deriye teması halinde: İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız ve temas eden kısımları sabun ve suyla yıkayınız.

Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarınız. Gerekirse suni teneffüs yaptırınız.

Yutulması halinde: Fazla miktarda ilaç alınması halinde hastaya 1-2 bardak su içirerek kusmasını sağlayınız. Hasta kendinde değilse, kusturmaya çalışmayınız.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika içinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. GABA'yı hızlandırıcı ilaçlar (Barbiturate, Benzodiazepin, Valproic acid) verilmemelidir.

Gerektiğinde **ULUSAL ZEHİR MERKEZİ** 'ni arayınız;
UZEM : 114



İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA :
Syngenta Crop Protection AG , Basel, İSVİÇRE
İTHALATÇI FİRMA :
Syngenta Tarım Sanayi ve Tic.A.Ş.
Kazım Dirik Mahallesi, 364 Sokak No: 11
Bornova / İZMİR Tel : (232) 435 80 54

® Syngenta şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

(Handwritten signature)

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dr. Ahmet ERGİÇ
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü

29 Nisan 2008

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR