

İmal Tarihi
Son Kullanma Tarihi
Şarj No
Ruhsat Tarihi ve No su : 05.07.1991 / 2451

APPLAUD, buprofezin aktif maddesini içeren böcek gelişimini düzenleyici bir bitki koruma ürünüdür. Nüfuziyede Kabuklu Böcek ve Beyaz sineği etkilidir. Entegre Mücadele (IPM) programları içinde önerilen bir üründür.

KULLANILAN BİTKİ VE ZARARLILAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	Kullanım Dozu ve Dönemi	Son kullanma ile hasat arasındaki süre (Gün)
Turuncgiller	Sarı Kabuklu Bit (Aonidiella citrina) Kırmızı Kabuklu Bit (Aonidiella citrana) Turuncgöl Beyaz Sineği (Diuraphis brassicae)	65 ml/ml nirli dönemde 65 ml/ml nirli dönemde 35 ml/ml	60

KULLANMA ŞEKLİ:

Turuncgillerde yaprak dışına en az 50' den fazla litre suya veya 100 yaprağa kadar seyreltilmiş 50' den fazla litre suya bu bahçelerde ilaçlama gereklidir. İlaçlama gereken bahçelerde bu zararlılara hemen sonra başlangıç grubu sonuna kadar olan dönemde ve yazın ilk hareketi nihai olarak önlemek için 2 ayın sonunda ilaçlama yapılabilir. Popülasyonun durumuna göre ilaçlama devam ettirilmelidir. İlaçlamaların en iyi sonucu alınması için ilaçlamaların düzenli olarak yapılması, daha sonra ağaçların bakımını yaparak ilaçlama aralıklarını uzatılmalıdır.

Turuncgöl beyaz sineği mücadelesi için yapılan ilaçlamalarda yaprak başına en az 3 adet canlı biley (yumurta, nimf) görüldüğünde ilaç mücadeleye başlanmalıdır. Dozda üç kez 3. Dönemlerde görüldüğünde 1 ilaçlama yapılır. Bu dönem Haziran ayının ilk yarısına denk gelmektedir. 2. İlaçlama dönemi Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yapılır. İlaçlamada özellikle yeni sümüksü genç yapraklar olmak üzere yaprakların alt yüzlerinin iyice iltismana gözün gösterilmelidir.

İlaçlama için bir depoya gerekli ilaç miktardan önce aynı bir kapta sulandırılır ve elinin yardımıyla diğer dokuzuncu depoya ilave edilir ve karıştırılır. Sonra depo tamamen doldurulur.

KARİŞİRBİLİRLİK DURUMU:

Applaud 40 SC, Karanfil, Arı, Meleke, Actellic, Pirimor ilaçları ile karıştırılarak kullanılabilir. Karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapıldıktan sonra ilaçlama aynı ayın sulandırılmadan sonra karıştırılmadan tavsiye edilir.

APPLAUD® 40 SC
syngenta

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Süspansiyon Konsantré
Litrede 400 gr saf Buprofezin içerir

2 ltr'l bulaşımına-3 isopropil-6-phenylperhydro-1,3,5 triadiazin-4-one

Aküt oral LD50 (sıçanlarda): 2196 mg/kg

DİKKAT

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KESİNLİK İLE KULLANMAYINIZ. ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN, İÇECEKLERDEN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. İLAÇ BULHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFÜS ETMEYİNİZ. MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DÜVEN, YOZ KALKANI KULLANINIZ. İLAÇLAMA ESNASINDA NİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ. İÇMEYİNİZ VE SİĞARA KULLANMAYINIZ. DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÖRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI BAHAYA GİREMEZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İlaç hasaslığı zehirlenme belirtileri yoktur. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal görülebilir.

İLK YARDIM:

Eğer gözle temas edilirse: Göz kapaklarını açıp bol suyla yıkayın. Eğer 10-15 dakika yıkayınız. Doktora başvurunuz.

EĞER APPLAUD 40 SC YALNIZCA İLE HASTALIK KULLANMAYINIZ. Antiseptik ile birlikte hastalığı tedavi için derhal doktora görününüz.

TEDAVİ ŞEKLİ:

Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek, mide yıkanmalıdır. Sonra simptomatik ve tavsiye edilmiş tedavi uygulanmalıdır.

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur.

Zehirlenme halinde Zehir Danışma Merkezinin 0800 314 79 00 no'lu telefonuna başvurunuz.



TARIM VE KÖYİŞLERİ HAKANEDİĞİ
KORUMA KONTROL VE MÜHÜRLEME
KAĞI
KARŞIYAKA

05 Temmuz 2004

Net Miktar
Brüt Ağırlığı
Azami per. seliş fiyat
T.K.B. Yazısının tarihi ve No'su

Dr. K. Necdet Ongen

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE
Emniyet Önlemlerini Okuyunuz

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

EMNİYET TEDBİRLERİ:

- Bu ilacı kullanırken elgama ve içecek içmeyiniz ve bir şey yemeyiniz.
- Anlarsa zararlıdır.
- Bahçeye zararlıdır. Havuzları, nehirleri ve su yollarını boş ambalaj kapları ve diğer kırıntılarıyla temizleyiniz.

KARİŞTİRME SİRASINDAN TEDBİRLER:

- Sulandırılmamış Applaud 40 SC gıcirtinizde zarar verebilir. Gözünüzde gıcirtinizde derini yıkayınız. İki yarım tedbirinize bakınız.
- Sulandırılmamış Applaud 40 SC derinize gıcirtinizde derhal yıkayınız. Eğer etkilerinizi gözlemlerseniz derhal ve hemen yıkayınız.

İLAÇLAMA SİRASINDAN TEDBİRLER:

- Bol su ile ilaçlamadan önce, ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaçla temasından kaçınınız.

İLAÇLAMA SONRASI TEDBİRLER:

- Yıkayınız. İki etkilerinizi derhal yıkayınız ve yıkayınız.
- Ambalajı boşaltmayınız. Boş ambalajları temiz kullanmayınız.
- Elip veya kesip yıkayınız veya gömünüz.
- Kullanılmayan Applaud 40 SC ilacını ambalaj içinde, ağır sızma kapalı olarak çocukların erişemeyeceği bir yerde ve güdelerden uzakta, iltisafında saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER:

- İlaç orijinal ambalaj içinde, ağır sızma kapalı olarak, güdelerden uzakta çocukların ve hayvanların erişemeyeceği derin ve kuru bir yerde, iltisafında muhafaza edilmelidir.
- İlaç iltisafından itibaren, normal depolama şartlarında ağır sızma kapalı ambalajında iltisaf ve iltisafı ile birlikte en az 2 yıl korur.

FİRMA BEYANI:

İlaçla ilgili ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımlardan doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI:

NIHON MOHYAKU CO., LTD.
2-3, Nishinobori 1-Chome, Chuo-ku,
Tokyo, JAPAN

İTHALATÇI VE SATICI:

BYNGENTA Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kazım Dirik Mahallesi, 354 Sokak No: 11
35100 Bornova / İZMİR

Tel: 0 232 435 80 04

©- Nihon Mohyaku firmasının tescilli ticari markasıdır.

Dr. K. Necdet Ongen
SYNGENTA Tarım Sanayi
ve Ticaret A.Ş.



Genel Müdürlük Yardımcısı