

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj no:
Fiyat tasdik tarih ve no :

Genel bilgi :

Aprin XL 350 ES, sistemik özelliklere sahip, ayçiçeğinde mildiyö- *Plasmopara halstedii* (köse) mücadelesinde tohum ilacı olarak kullanılan "emülsiyon tohum ilacı" özel sıvı bir fungusittir. İlaç, ayçiçeği tohumunun çimlenmesi esnasında kökler tarafından alınır ve bitkinin her tarafına naklolularak hassas devre boyunca ayçiçeğini hastalıktan korur. Ayçiçeği mildiyösü, tüm gelişme devrelerinde ayçiçeğine arız olabilir. Fakat fide döneminden 6 yapraklı döneme kadar olan bulaşmalar ekonomik önemi haizdir. Hastalık erken dönemde gelmiş ise fideler kurur, bodur (köse) kalır, yapraklar kıvrılır, yaprak dibinden başlayan renk bozuklukları görülür. İleri dönemlerde, çiçek tablasındaki şekil bozuklukları, kellelerin dik kalması, tohumların olgunlaşmaması gözlenir.

Kullanıldığı Bitki ve Kontrol ettiği Hastalıklar

Bitki	Hastalık adı	Kullanma dozu ve dönemi
Ayçiçeği	Mildiyö (<i>Plasmopara halstedii</i>)	250 ml/ 100 kg tohuma

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ :

Aprin XL 350 ES tohum ilaçlama tesislerinde mevcut her türlü tohum ilaçlama aleti ile örneğin "continuous flow seed treater" olarak adlandırılan alet veya dönerek çalışan ilaçlama bidonu (rotating drum) ile uygulanabilir.

Çiftçi koşullarında ise; beton mikserleri, tohum ilaçlama bidonları ve hatta teneke kutular içinde bile tohuma kolayca tatbik edilebilir. Esas olan tohumun mütecanis olarak ilaç ile kaplanmasıdır.

Aprin XL 350 ES önce 100 kg tohuma yarım ila bir litre su hesabıyla sulandırılarak aşağıdaki şekilde bir ilaçı mahlul (bulamaç) hazırlanır. Sonra bu bulamaç tohuma tatbik edilir.

Bulamacın hazırlanması:

- Önce tanka bir miktar su konur.
- Bu suyun üzerine gerekli miktarda Aprin XL 350 ES dökülür.
- Su ile ilaç iyice karıştırılır.
- Sonra suyun kalan kısmı ilave edilir.
- Kullanım esnasında da karıştırma işlemi devam etmelidir.

Hazırlanan bu bulamaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

İlaçlama işlemi:

Önce, tohum ilaçlama aletinin içine konur. Sonra tavsiye dozu üzerinden bu miktar tohum için gerekli bulamaç tohuma ilave edilir. 1-3 dakika süreyle iyice karıştırılır.

Bitki tahammülü

Tavsiye edilen şekilde kullanıldığında Aprin XL 350 ES tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir. Tereddüt halinde bitki toleransı önceden kontrol edilmelidir.

Diğer ilaçlarla karışma durumu

Nötr reaksiyonlu diğer tohum ilaçlarının "WS" veya "FS" formülasyonlarıyla karışım halinde kullanılabilir.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

syngenta

Aprin[®] XL 350 ES

syngenta

FUNGİSİT (Mantar ilacı)
(ES=Emülsiyon formülasyonlu Sıvı Tohum İlacı)

Litrede 350 g metalaxyl-M = methyl N- (methoxyacetyl) -N-
(2,6-xylyl) D--alaninate

Sıçanlarda akut oral LD₅₀ : 667 mg/kg.

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ

SİGARA İÇMEYİNİZ

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİK
YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLYARDIM TEDBİRLERİ : Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç ile temas halinde, yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız. İlaç göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak, gözünüzü suyla en az 15 dakika süreyle yıkayınız. Sulandırılmamış ilaç derinize geldiğinde hemen yıkayınız. Elbiselerinize dökülmüş ise hemen değiştirip yıkayınız. Eğer yutulmuş ise hastayı kusturmayınız. Hastayı, ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz. ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezini arayınız : ÜZEM : 114



19 Subat 2009

Net ve Brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı:
Ruhsat tarih ve no. : 18.12.1998-3553/ 98-183

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

Tohum ilaçlama işlemi havadar bir yerde yapılmalıdır. Yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce el ve yüzünüzü yıkayınız. İş bittikten sonra elbiselerinizi değiştirin ve tüm vücudunuzu yıkayın. Tekrar kullanmadan önce iş elbiselerinizi yıkayın. Eğer bir rahatsızlık hissedilir ise hemen işi bırakın ve doktor çağırın.

Kalan ilaç mahlülünü kuyu , havuz , çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne göre imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU :

İlaç orijinal ambalajında kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, iyi havalandırılan bir yerde güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz. +35° C' nin üzerinde muhafaza etmeyiniz. Normal şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajlarında fiziki vasıflarını asgari 2 sene muhafaza eder.

İLAÇLI TOHUMUN MUHAFAZASI :

İlaçlı tohum insan sağlığına zararlıdır. İlaçlı tohumlar bunların ilaçı olduğu açıkça belirtilen ambalajlarda muhafaza edilmelidir. Bu tohumlar yem ve gıda maddelerinden uzakta saklanmalıdır. İlaçlı tohumlar hayvan yemi veya gıda maddesi olarak kullanılmamalıdır. İlaçlı tohum iyi bir şekilde ekilmeli ve üzeri toprakla örtülmelidir.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasıyla doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ :

Syngenta Crop Protection AG., Basle, Switzerland
İTHALATÇI :
Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak No. 11
35100 Bornova / İZMİR
Telefon: (0232) 435 80 54

® - Syngenta şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.