İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No. :
Fiyat Tasdik Tarih ve No :

Etki şekli : Armure 300 EC ilacında bulunan difenoconazole ve propiconazole aktif maddeleri bitkinin yeşil aksamından bünyeye alınır ve fungal etmenlere, bitkiye girişi (penetrasyon) ve haustorya teşekkülü esnasında müdahale eder. Bu her iki aktif madde hücre çeperlerinde sterol biyosentezini engelleyerek fungal etmenlerin gelişimini önler.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR :

Bitki	Hastalık adı	Kullanma dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arası Süre (Gün)
Şeker pancarı	Pancar yaprak leke hastalığı *(Cercospora beticola)*	30 ml / da	21
Buğday	Septorya yaprak lekesi (*Septoria tritici*) Pas (*Puccinia* spp.) Külleme (*Erysiphe graminis* f. sp. *tritici*)	40 ml /da 40 ml / da 50 ml / da	21
Turunçgiller	Alternaria Yanıklık *(Alternaria alternata* f.sp.*citri)*	50 ml / 100 l su	21
Antepfıstığı	Karazenk *(Septoria pistacina)*	50 ml / 100 l su	21
Karpuz	Erken Yaprak Yanıklığı *(Alternaria cucumerina)*	50 ml / da	21

1) İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :
İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için,önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.
İlacın uygulamaya hazırlanması : İlaçlamadan önce aletin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, tümünün düzgün çalışması sağlanmalıdır. Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta ön karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

2) KULLANIM ŞEKLİ :
Şeker pancarı : İlk ilaçlama hastalık henüz çıkmadan koruyucu olarak yapılmalı, gerektiğinde 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.
Buğday : Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı, gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla devam edilmelidir.
Turunçgiller : İlaçlamalara sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır,15-20 gün aralıklarla devam edilir.
Antepfıstığı : Birinci ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi izleyen meyvelerin buğday tanesi kadar olduğu dönemde yapılır.Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılır.
Karpuz: İlaçlamaya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır,15-20 gün aralıklarla devam edilir.

Bitki tahammülü Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, tavsiye edilen bitkiler üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur.

3) KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Armure 300 EC, yaygın olarak kullanılan birçok ilaç ile tank karışımı halinde kullanılabilir. Tereddüt halinde bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

syngenta

Armure®300 EC

syngenta

FUNGİSİT (Mantar ilacı)
Emulsiyon
Litrede;
150 g/l propiconazole 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2yl-methyl]-1H-1,2,4-triazole +
150 g/l difenoconazole cis-trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4,-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether ihtiva eder.

Sıçanlarda Akut Oral LD_{50} : 1453 mg/kg

DİKKAT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ
SİGARA İÇMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLANMIIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.
İLKYARDIM TEDBİRLERİ : Zehirlenmeden şüpheleniliyor ise işi bırakınız ve doktor çağırınız. Hastanın ilaçla daha fazla temasını kesiniz. Elbiseleri çıkarıp , hastayı sabunlu su ile iyice yıkayınız. Hastayı iyi havalanan bir yere alınız. Şayet ilaç yutulmuş ise tıbbi destek isteyiniz, doktor çağırınız, veya hastayı, ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Gerektiğinde **ULUSAL ZEHİR MERKEZİ** 'ni arayınız :**UZEM : 114**

Net ve Brüt Ağırlığı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :
Ruhsat Tarih ve No: 25.03.1998-3372/98-52

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Balıklara zehirlidir. Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı, buradan yem ve gıda maddesi toplanmamalıdır. İlaç artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilaçla kirletmeyiniz. Evcil hayvanları ilaçlanmış sahadan uzak tutunuz. Yem ve gıda maddelerini ilaçla kirletmeyiniz. Artan ilacı usulüne uygun olarak imha ediniz.Boş ambalajları başka bir gaye ile kullanmayınız.
DEPOLAMA DURUMU :
İlacı serin ve kuru yerde, orijinal , sıkıca kapalı ambalajında iyi havalanan yerde yem ve gıda maddelerinden uzakta kilit altında muhafaza ediniz. İlacı -10°C'nin altında ve +35°C'nin üzerinde depolamayınız.
Bu ilaç normal depolama şartları altında açılmamış orijinal ambalajında fiziksel ve kimyasal özelliklerini asgari 2 yıl muhafaza eder.
FİRMA BEYANI :
Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır.
İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
Syngenta Crop Protection AG, Basle, İsviçre
İTHALATÇI FİRMA :
Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş
Kazım Dirik Mah. 364 Sk. No.11 Bornova, İZMİR
Telefon : (0232) 435 80 54

®=Syngenta Crop Protection AG, Basle, Switzerland'ın tescilli ticari markasıdır.

11 Mart 2008

TARİM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİSTİR

SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Bitki Koruma Büro Müdürü