

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj no. :
Fiyat tasdik tarih ve no :

BRAVO, Süspansiyon Konsantre(SC) formülasyonunda geniş etki alanına sahip bir fungisitir. İlacın bitki yüzeyine yapışma ve bitkiyi kaplama özelliği çok iyi olup yağmur ve sulama suyu ile hemen yıkanmaz; böylece ilaç yeterli bir süre etkisini korur

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık adı	Kullanma dozu	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	200 ml/ 100 l su	3
Kabakgiller	Yalancı Mildiyö(<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	250 ml/ 100 l su	3
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	175 ml/ 100 l su	3
Şeker Pancarı	Yaprak Leke Hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	300 ml/da	3
Kayısı	Yaprakdelen (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	200 ml/ 100 l su	60

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaşı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan veya ağaç düzünce islatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaşı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması : Uygulamadan önce iyi bir karışım elde etmek için ilacın ambalajını birkaç defa başaşağı çevirdikten sonra püskürtme tankını yarısına kadar temiz su ile doldurunuz ve gereken miktardaki BRAVO'yu tanka ilave ederek karıştırınız.

İLACIN KULLANIM ŞEKLİ :

Elmada karaleke : 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 70-80 döküldüğünde, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Kabakgillerde (hıyar) yalancı mildiyö : İlaçlamalara bitkiler kol atmaya başladığı dönemde veya hastalık tehlikesinin görülmesi durumunda başlanır ve 8-10 gün aralıklarla devam edilir.

Domateste mildiyö : İlaçlamalara çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır ve 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

Şeker Pancarında yaprak leke : İlaçlamalara yakın tarlalardaki pancarların % 5' inin yapraklarında en az 10' ar leke görüldüğünde başlanır.

Kayısıda yaprak delen : 1. ilaçlama, sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama, ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu devresinde, 3. ilaçlama, meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası (kılıf) meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

DEVAMI ARKA SAYFADA:

06 Kasım 2008

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



syngenta
BRAVO®

syngenta

FUNGİSİT (Mantar ilacı)]
Süspansiyon Konsantre
Litrede 500 gr. chlorothalonil
tetrachloroisophthalonitrile
2,4,5,6-tetrachloro-1,3-benzendicarbonitrile
Sıçanlarda akut oral LD₅₀ : >5 000 mg/kg

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇLAMADAN SONRA 3 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN

İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

BRAVO nun akut oral ve dermal toksisitesi düşük olmasına rağmen uygulama sırasında normal korunma tedbirlerine dikkat edilmelidir. Gözlerle ve açık deri bölgeleri temas halinde kızarıklık, bronşlarda hafif tahriş şeklinde geçici alerjik yan etkiler görülebilir. Bu hal geçici olup kalıcı bir iz bırakmaz.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor ağrınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç le temas halinde, yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız. İlaç göze elmiş ise göz kapaklarını açarak, gözünüzü suyla en az 15 dakika süreyle yıkayınız. Sulandırılmamış ilaç derinize geldiğinde hemen yıkayınız. Elbiselerinize dökülmüş ise hemen değiştirip yıkayınız. Eğer yutulmuş ise hastayı kusturmayınız. Doktor çağırınız veya hastayı, ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz

ANTİDOTU VEYA TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Tahrişlerin tedavisinde antihistaminikler veya steroid pomadlar veya sistemik steroidler tedavi tavsiye edilir.

Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezini arayınız : UZEM : 114

Net ve brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Ruhsat tarih ve no.: 15.09.1998 / 3492/98-122

**AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE
EMNİYET ÖNERİLERİNİ OKUYUNUZ**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara ve balıklara zehirlidir. İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız. Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız. Boş ilaç ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz. İlaç ile çalışırken ağızınızı ve burnunuzu içine alan maske takınız.

DEPOLAMA DURUMU : İlaç orijinal ambalajında, ağız kapalı olarak, güneş görmeyen, kuru, havadar bir yerde yiyecek ve yemlerden ayrı bir bölmede, kilit altında saklanmalıdır. Normal şartlarda asgari 2 yıl fiziksel ve biyolojik özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI : Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG,
Basle, İsviçre

İTHALATÇI FİRMA :

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kazım Dirik Mah. 364 Sk. No.11 Bornova,
İZMİR Telefon : (0232) 435 80 54

®=Syngenta Şirketler Topluluğunun tescilli ticari markasıdır

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü

Adil

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

BRAVO yaygın olarak kullanılan WP olarak formüle edilmiş birçok insektisit, fungusit ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak ilaç etiketleri üzerindeki tavsiye ve dozlara dikkat edilmelidir. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Değişik formülasyonlardaki EM gibi diğer ilaçlarla karıştırılırken bir deneme yapılarak karışımın ve uygulamanın izlenilmesi ve daha sonra uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir. Sürfaktanlar veya yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

syngenta

BRAVO®


syngenta

FUNGİSİT (Mantar ilacı)
Süspansiyon Konsantré
Litrede 500 g chlorothalonil
tetrachloroisophthalonitrile
2,4,5,6-tetrachloro-1,3-benzendicarbonitrile

Sıçanlarda akut oral LD₅₀ : >5 000 mg/kg

06 Kasım 2008

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.