

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şerh No :  
Ruhsat Tarih ve No.su : 20.02.1989-2285

# SYNGENTA

## CAPTAN® 50 WP STAUFFER

syngenta  
FUNGİSİT (Mantar İlacı)  
İlanabilir Toz

### KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR :

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre ( Gün )
<b>MEYVE</b>			
Armut	Karaleke ( <i>Venturia pirina</i> )	150 g / 100 l su	3
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	150 g / 100 l su	3
Erik	Cep hastalığı ( <i>Taphrina pruni</i> )	200 g / 100 l su	3
Şeftali	Monilya ( <i>Monilia laxa</i> )	300 g / 100 l su	3
Kayısı-Şeftali	Yaprakdaşen ( <i>Clasterosporium carpophilum</i> )	300 g / 100 l su	3
Kiraz ve Vişne	Monilya ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	300 g / 100 l su	3
Yeridünya	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis var erobotryse</i> )	300 g / 100 l su	3
<b>TURUNÇGİLLER</b>			
	Kahverengi çürüklük ( <i>Phytophthora citrophthora</i> )	300 g / 100 l su (Meyve enfeksiyonları)	7
<b>BAĞ</b>			
	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	300 g / 100 l su	3
	Ök kol ( <i>Phomopsis viticola</i> )	250 g / 100 l su (yaz uygulaması)	3
<b>SEBZE</b>			
Sebze fidelikleri	Kök çürükükleri ( <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	200-250 g / 100 l su	7
	Sebzelerde Kurşunlî Küt ( <i>Botrytis cinerea</i> )	250 g / 100 l su	7
Domates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	300 g / 100 l su	7
	Yaprak kütü ( <i>Cladosporium fulvum</i> )	250 g / 100 l su	7
Marul	Mildiyö ( <i>Bremia lactucae</i> )	300 g / 100 l su	7
Soğan	Mildiyö ( <i>Pseudomonas destructora</i> )	300 g / 100 l su	7
Patates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	350 g / 100 l su	7
<b>ENDÜSTRİ VE SÜS BİTKİLERİ</b>			
Karanfil	Pas ( <i>Uromyces dianthi</i> )	250 g / 100 l su	7

### KULLANMA ŞEKLİ :

İlaçlamaya, hastalık görülmeyen önce koruyucu olarak başlanmalıdır ve yeni gelişen bitki kısımlarının korunması için ilaçlamalar tekrarlanmalıdır.  
İlaçlamadan iyi bir sonucun alınabilmesi için, kaplamaların iyi yapılması gerekir.  
(yaprakların alt yüzü de ilaçlanmalı)

### İlaçın Hazırlanması :

Bir depo için gerekli olan ilaç miktardan önce ayrı bir kaptan su ile iyice karıştırılarak bulamaç haline getirilir. Bu karışım, yarıya kadar temiz su ile dokunulmuş aletin deposuna ilave edilir. Depodaki suyun karıştırılmasına devam edilerek su ilave edilir ve depo doldurulur. Deposunda karıştırıcısı bulunan püverizatörle ilaçlamanın yapılması tavsiye edilir.

### KARŞIĞI DURUMU :

Captan 50 WP Stauffer, Karate Zeon, Imperator, Anvil, Meteor gibi insektisit, akarisit ve fungisitlerle ve ayrıca Barezex ile karıştırılarak kullanılabilir. Yağlar ve yüksek alkali ilaçlar (Bordo bulamacı gibi) hariç diğer ilaçlarla karışır. Yağ ilaçları birlikte kullanılmayın.

% 50 Captan  
N - (Trichloromethyl) thio - 4 - cyclohexene - 1,2 - dicarboximide

Şişelerde akut oral LD<sub>50</sub> : 9000 mg/kg

### DİKKAT

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
- EVDE KULLANMAYINIZ
- ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN, İÇECEKLERDEN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ
- İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
- KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, SİPERLİK KULLANINIZ
- İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA İÇMEYİNİZ
- DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
- İLAÇLANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Gözlerde, boğazda, burunda ve ciltte tahrişe neden olabilir.

### İLYARDIM TEDBİRLERİ :

İlaç göze gelmiş ise, göz kapaklarını açarak gayet yavaş akan suyla 10-15 dakika yıkayınız. Doktora başvurunuz.  
Eğer ilaç yutulmuş ise, hastayı kusturmayınız. Hastayı ilaç ambalajı ile birlikte tedavi için doktora götürünüz.

### TEDAVİ ŞEKLİ :

Mide muhteyatının solunum yollarına kaçmamasına özen göstererek mide yıkanmalıdır. Sonra semptomatik tedavi uygulanır.

### ANTİDÖTÜ :

Toksitesi düşük olup, özel bir antidötü yoktur. Zehirlenme halinde zehir danışma merkezinin 0800 314 79 00 no'lu ücretsiz telefonunu arayınız.



23 Ağustos 2004

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktar :  
Brüt Ağırlığı :  
Azami per. satış fiyatı :

T.K.B. Yazınının Tarih ve No'su :

### AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

### KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

### EMNİYET TEDBİRLERİ :

Kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz. Hiçbir şey yemeyiniz.

### KARİŞTİRME SİRASINDAKİ TEDBİRLER :

- Göz koruyucusu (en azından gözlük) kullanınız.  
Toz ilaç gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlyardım tedbirlerine bakınız.

- Toz ilaç derinize bulmuş ise, onu derhal fırça ile temizleyiniz. Elbisenize dökülmüş ise değiştirip yıkayınız.

- Burun ve ağzınızı kapatacak şekilde maske takınız.

- İLAÇLAMA SİRASINDAKİ TEDBİRLER :  
- Bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız.

- Bakılara zarar vermemek için, ilacı sulara püskürtmeyiniz.

### İLAÇLAMA SONRASI TEDBİRLER :

- Yıkayınız. İğ elbiselerinizi değiştiriniz ve yıkayınız.

- Boş ambalajı yıkayınız veya gömünüz. Onu tekrar kullanmayınız.

- İlaç ve ilaç artıklarını suya dökmeyiniz.

- Kullanılmayan ilacı ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalardan uzakta, kilit altında saklayınız.

### DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER :

- İlaç, ambalajında kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilit altında, iyi havalandırılan, güneş ve rutubetten uzakta bir yerde muhafaza ediniz.

35°C' nin üzerinde depolamayınız.

- İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

### FİRMA BEYANI :

Firma, uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanılmasıyla doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

### ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ :

Ankara : (0800) 314 79 00

İzmir : (0232) 277 73 33

İMALATÇI: Syngenta Crop Protection AG  
Basle, Switzerland

İTHALATÇI: Syngenta Tarım San. ve Tic.A.Ş.

364 Sk. No. 11

35100 Bornova, İZMİR

Tel. (0232) 435 80 54

©- Syngenta şirketleri grubunun tescilli ticari markasıdır.

Dr. Ramazan ÇANKAYA  
Bakan Yardımcısı  
Genel Müdür Yardımcısı

