

# syngenta

## CELEST MAX 100 FS®

syngenta

İmal tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şerh no.:  
Ruhsat tarih/No.: 08.11.2004 - 4870

### İlacın özellikleri :

CELEST MAX 100 FS patatesta Gövde Kanseri (Siyah Siğil) hastalığına sebep olan *Rhizoctonia solani* Kühn. Etmenini başarıyla kontrol eden ve fludioxonil aktif maddesini içeren yeni geliştirilmiş akıcı sıvı tohum ilacı (FS) formülasyonunda modern bir tohum ilacıdır.

### Etki şekli

Fludioxonil, residuel etkili, geniş etki sahali bir kontak fungusittir. Sistemik değildir, penetratif hareket tarzı vardır.

### Kullanıldığı bitki ve kontrol ettiği hastalıklar

Bitki	Hastalık	Kullanma dozu
Patates	Gövde Kanseri (Siyah Siğil) ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	20 ml / 100 kg tohuma

### Uygulama tekniği, ekipman ve ilacın hazırlanması :

CELEST MAX 100 FS, iyi bir şekilde kalibre edilmek şartıyla "Flow Seed Treater" diye tabir edilen ve tohumlar yürür banıtan geçerken memelerden ilaç püskürtülerek ilaçlama yapan aletlerle veya bünyesinde sisleme odası bulunan döner diskli (spinning disk) tohum ilaçlama aletleriyle sulandırılmadan veya sulandırılarak kullanılabilir. İlaçlamada ayrıca dönen bidon ( rotating drums) sistemli aletler de kullanılabilir. Çiftçi şartlarındaki uygulamalarda , beton hazırlama mikserleri , ilaçlama bidonları da kullanılabilir.

Sulandırılarak kullanılmak istendiğinde ilaç ön karışımı aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır :

\*İlaç karışım kabına aşağıdaki örnekte verilen miktarda su doldurunuz

\*Kullanmadan önce ilacı iyice çalkalayınız

\*Devamlı olarak karıştırırken gerekli miktarda Celest Max 100 FS 'yi suya ilave ediniz.

\*Kullanım sona erinceye kadar bu ilaç ön karışımı devamlı olarak karıştırılmalıdır.

\*Bu karışım hazırlandıktan sonra en geç 24 saat içinde kullanılmalıdır.

**ÖRNEĞİN :** 100 kg 'lık patates tohumunu ilaçlamak için tavsiye edilen ilaç 1000 ml su ile yukarıdaki şekilde karıştırılarak ön karışım elde edilir. Elde edilen bu ön karışım 100 kg 'lık tohuma belirtilen aletlerle yeknesak olarak uygulanır. Çiftçi şartlarında, temiz bir zemin üzerine serilmiş tohumluk üzerine sırt pülverizatörü kullanılarak tatbik edilir.

Uygulama sırasında tohumluk iyice karıştırılmalı, yumruların iyi bir şekilde ıslanmaları sağlanmalıdır.

### Bitki tahammülü

Tavsiye edilen şekilde kullanıldığında CELEST MAX 100 FS tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir. Tereddüt halinde bitki toleransı önceden kontrol edilmelidir.

### Diğer ilaçlarla karışma durumu:

Nötr reaksiyonlu diğer tohum ilaçlarının "WS" veya "FS" formülasyonlarıyla karışım halinde kullanılabilir

### FUNGİSİT (Mantar ilacı)

Akıcı Sıvı Tohum ilacı formülasyonu (FS)

Litrede,

100 gram Fludioxonil= 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrole-3- carbonitrile ihtiva eder

Şiçanlarda akut orai LD<sub>50</sub> fludioxonil: > 5000 mg/kg

## DIKKAT

### ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ,

SİGARA İÇMEYİNİZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN

İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR

### Kullanıcının emniyeti

Tohum ilaçlama işlemi havadar bir yerde yapılmalıdır. Yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce el ve yüzünüzü yıkayınız. İş bittikten sonra elbiselerinizi değiştirin ve tüm vücudunuzu yıkayın. Tekrar kullanmadan önce iş elbiselerinizi yıkayın. Eğer bir rahatsızlık hissedilir ise hemen işi bırakın ve doktor çağırın.

### Zehirlenme belirtileri

İnsanlarda zehirlenme belirtisi görülmemiştir.

### İkyardım

Rahatsızlık hissedilir ise işi bırakın. Temiz havaya çıkın. İlaçla daha fazla temas etmeyin. Tüm iş elbiselerinizi çıkarın. Hastayı sabunlu su ile iyice yıkayın. Gözleri temiz bol su ile en az 15 dakika çalkalayın. Doktora başvurun. Şayet ilaç yutulmuş ise bol su ile bol miktarda tıbbi kömür veriniz. Baygın hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilemez.

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



08 Kasım 2004

Net ağırlığı:  
Brüt ağırlığı:  
Azami perakende satış fiyatı:  
Tarım ve Köyişleri  
Bakanlığı yazısının tarih/no.su

Kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar  
Suda yaşayan canlılara çok zehirlidir. Kalan ilaç mahiülünü kuyu, havuz, çeşme yatakları ve akarsulara dökmeyiniz. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne göre imha ediniz.

### Depolama durumu ve diğer bilgiler

İlaç orijinal ambalajında serin ve kuru bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta, kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden ayrı kilitli, iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz. +35° C' nin üzerinde 0° C' nin altında muhafaza etmeyiniz. Normal şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajlarında fiziksel vasıflarını en az 2 sene muhafaza eder.

### İlaçlı tohumun muhafazası

İlaçlı tohum insan sağlığına zararlıdır. İlaçlı tohumlar bunların ilaç olduğu açıkça belirtilen ambalajlarda muhafaza edilmelidir. Bu tohumlar yem ve gıda maddelerinden uzakta saklanmalıdır. İlaçlı tohumlar hayvan yemi veya gıda maddesi olarak kullanılmamalıdır. İlaçlı tohum, iyi bir şekilde ekilmeli ve üzeri toprakla örtülmelidir.

### YANICI DEĞİLDİR.

### Kullanıcının dikkatine

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanımından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

### ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ

Ankara (0800) 314 79 00

İzmir (0232) 277 73 33

İmalatçı: Syngenta Crop Protection AG., Basle, Switzerland

İthalatçı: Syngenta Tarım San. ve Tic.AŞ  
Kazım Dirik Mah. 364 Sk. No.11  
Bornova-İZMİR

Tel.: 0232.435 80 54

(R) Syngenta Şirketler topluluğunun tescilli ticari adıdır

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  
KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL ÇEVRESİDİR.

SYNGENTA TARIM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dr. Ramazan ÇANBAĞCI  
Genel Müdür

Genel Müdür



08 Kasım 2004