

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj no :
Fiyat Tasdik Tarih ve No.:

İlacın özellikleri ve etki şekli:

DIALEN SUPER 464 SL, çıkışı sonrası (post -emergens) olarak kullanılan seçici özellikte sistemik bir herbisit olup buğday ve arpada tek ve çok yıllık geniş yapraklı yabancıotların mücadelesinde kullanılır. *Dicamba*, yabancı otların aktif olarak büyüyen kısımları ile alınarak tüm bitkide büyüme noktalarına taşınır ve embriyonik hücrelerde birikir. 2,4-D ise selektif sistemik bir herbisit olup yabancı otların yine aktif büyüyen kısımları ile bitkiye alınarak gövde ve köklerin meristematik bölgelerinde birikirler, büyüme inhibitörü olarak davranırlar.

Kullanıldığı Bitkiler ve Yabancıotlar

Bitki Adı	Kontrol ettiği yabancıotlar	Kullanma Dozu (ml/da)
Buğday	Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>) Boz tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus galacticus</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Uzun süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>) Kokulu sarı yonca (<i>Melilotus officinalis</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Adi Fiğ (<i>Vicia sativa</i>) Kangal (<i>Silybum marianum</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>)	100 (çıkış sonrası)
Arpa	Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Adi Fiğ (<i>Vicia sativa</i>) Çoban Çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Serçe Dili (<i>Stellaria media</i>) Dil Kanatan (<i>Galium aparine</i>) Yabani Turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	100 (çıkış sonrası)

1) İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama aletinin kalibrasyonu: İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır, harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlaçlı mahlülün hazırlanması : İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar suyla doldurunuz, bunun üzerine gerekli miktar ilaç ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılarak ilave edilir. Karıştırmaya devam ederken depo, su ile üst seviyesine kadar doldurulur. Boş ambalaj kapları su ile 3 kez çalkalanarak ilaçlı mahlüle ilave edilmiştir. İlaçlama süresince aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalı, ilacın hazırlanma-sında temiz su kullanılmalıdır.

2) KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama zamanı : DIALEN SUPER 464 SL yabancıotlar çıktıktan sonra kardeşlenme döneminde ılık ve nemli havada uygulanmalıdır. Mücadeleden en iyi sonucu alabilmek için yabancıotların 2-3 yapraklı olduğu (rozetler 5 cm den küçük) genç dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Aşırı kurak veya don beklendiğinde ve yabancı otların streste olduğu dönemlerde ilaçlamadan kaçınılmalıdır, ilacın performansı düşebilir. En iyi sonuç, buğday, arpa ve yabancı otların aktif büyüme dönemlerinde olduğu erken uygulamalardan elde edilir.

Uygulama : DIALEN SUPER 464 SL, orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ve sırt pülverizatörü ile dekara asgari 20 litre su kullanılarak, uygulanmalıdır. İlaçlı mahlülün yeknesak dağılımı için düz yelpaze meme kullanılmalı tavsiye edilir. Pompa basıncı düşük (2-3 atmosfer) olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır. Uygulamadan en iyi sonuçlar sıcaklığın 10-25 °C ler arasında olduğunda alınır.

Bitki tahammülü : Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday ve arpa tarafından çok iyi tolere edilir. Geç uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Münavebe esnekliği : DIALEN SUPER 464 SL toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebeye girecek kültür bitkilerine herhangi bir fitotoksitesi yoktur.

syngenta®

DIALEN SUPER® 464 SL

HERBİSİT (Yabancıot ilacı)
Suda çözünbilir sıvı

Litrede:

120 gr. *dicamba* = 3,6-dichloro-0-anisic acid (dimethyl amonyum tuzu) ve
344 gr. 2,4-D = (2,4-dichlorophenoxy)-acetic acid içerir.

Sıçanlarda akut Oral LD₅₀ 2,4-D: 639 mg/kg

DİKKAT

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.**

**ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE SİPERLİK KULLANINIZ.
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,
SİGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Zehirlenmeden şüphe ediliyor ise derhal işi bırakınız ve doktor çağırınız. İlaç ambalaj ve etiketini gösteriniz. Cilt teması halinde derhal bulaşık elbiseleri çıkarınız ve bu kısımları bol su ve sabun ile yıkayınız. Gözlere bulaşırca, bol temiz su ile asgari 15 dakika yıkayarak temizleyiniz. İlacın teneffüs edilmesi halinde temiz havaya çıkınız. Konsantrite ilacın ağız yoluyla çok miktarda alınması halinde ise tıbbi yardım isteyiniz, hastayı ilaç ambalaj veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz.

Not: Baygın hastaya kesinlikle ağızdan birşey verilmez ve kusturulmaz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.

**Gerektiğinde ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİ arayınız;
UZEM Tel : 114**



12 Mayıs 2008

Net ve Brüt Ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Ruhsat Tarih ve No. : 17.01.2007 / 5 815

**AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET
TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarıyla su kaynaklarını kirletmeyiniz. Yeni ilaçlanmış sahalardan ot almayınız, hayvanları otlatmayınız. İlaç karışımını ihtiyaç kadar hazırlayınız. İhtiyaç fazlası ilaçlı mahlül kalırsa on misli su ile seyrelterek ilaçlanmış araziye veya nadas araziye püskürtünüz. Yıkama suyunu nadas araziye dökmünüz. Boş ambalajları başka bir gaye ile yeniden kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz. Rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız. Hava sıcaklığı 28°C yi geçerse, daha serin olan akşam saatlerinde uygulama yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU :

İlaç kapalı ambalajında, yem ve gıda maddelerinden ayrı, iyi havalandırılan, serin ve kuru şartlarda, güneş ve rutubetten uzak bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz. Su, gıda ve yemleri bulaştırmayınız. -10° C 'nin altında ve +40° C 'nin üzerinde depolamayınız. İlaç normal şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı üretici firmanın kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. Üretici firma ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG.,

Basle, İSVİÇRE

İTHALATÇI FİRMA :

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak No: 11

35100 Bornova İzmir

Telefon : (0232) 435 8054

®-Syngenta şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

Dr. Ahmet ARSLAN
Genel Müdür Yardımcısı
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Ahmet ERCİS
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü
SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.