

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No. :
Fiyat tasdik tarih ve no :

DUAL S GOLD 915 EC, pamukta topalak ile dar yapraklı ve bazı geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

DUAL S Gold 915 EC , pamuk ekim alanlarında ekimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5cm. kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan, Topalak (*Cyperus spp.*) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancı otları ; bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden topraktan etkili selektif bir yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ilacı alırlar ve imha olurlar.

Kullanıldığı bitki ve kontrol ettiği yabancı otlar:

Bitki adı	Yabancı ot adı	Kullanma dozu ve dönemi
Pamuk	Topalak (<i>Cyperus roduntus.</i>) Darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) (<i>Echinochloa cruss-galli</i>) Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleraceae</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	150 ml/dekar ekim öncesi toprağa karıştırılarak

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlacın uygulamaya hazırlanması: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve karıştırılmaya başlanır. İlaçlanacak alan için gerekli ilaç tanka eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Tankın geriye kalan kısmı su ile doldurularak tüm ilaçlama boyunca karıştırıcının çalışmasına özen gösterilmelidir. Dekara 20 litre su kullanılmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ :

Ekim öncesi toprağa pülverize edilir ve toprağa karıştırılır. Toprakten etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi DUAL S Gold 915 EC'den beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, taria kesek, ot ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır. İlacın toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için gereklidir. İlaç, tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültivatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir. İlaçlamadan sonra orta derecedeki bir yağış veya sulamanın; ilacın yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda DUAL S Gold 915 EC kullanılması tavsiye edilmez !

syngenta

Dual® S Gold 915 EC

syngenta

HERBİSİT (Yabancıot ilacı)

Emülsiyon

Litrede ; 915 gram S-metolachlor

= (aRS,1S)-2-chloro-6'-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acet-o-toluidide ve 20-0% (aRS,1R)-2-chloro-6'-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acet-o-toluidide karışımı ve 45 gram herbisit antidotu benoxacor 2,2-dichloro-1-(1-methyl-2-3-dihydro-benzo[1,4]oxazin-4-yl)-ethanone ihtiva eder.

Sıçanlarda akut oral LD₅₀ : 2780 mg/kg.

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ

SİGARA İÇMEYİNİZ

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN

İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme vs.
İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Hastayı ilaçlama sahasından derhal uzaklaştırın. İlaça bulaşık elbiseleri çıkarın. Cildi tahriş edebilir. Cilte ilaç değen yerleri bol su ile yıkayın. Göze bulaşması halinde asgari 15 dakika temiz su ile gözleri yıkayınız. Hasta soluk almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırın. Ağız yolu ile meydana gelen zehirlenmelerde hasta kendinde ise ılık tuzlu su, sabunlu su yardımıyla veya boğaza parmak sokarak kusturun. Hastayı başı yana dönük olarak yatırın. Gerekğinde doktor çağırın veya hastayı ilacın ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürün.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Gerekğinde Ulusal Zehir Merkezini arayınız

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) : 114



Net ve brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Ruhsat tarih ve no. : 29.12.1998-3558/98-188

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

-Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.
-Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
-Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
-İlaçlama esnasında ilacın bitişikteki ürünlere sürüklenmemesine dikkat ediniz
- İlaçlı yerde hayvan otlatmayınız, ot almayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

İlacı serin ve kuru yerde , kilit altında , orijinal ambalajında ağız kapalı olarak çocuklardan ve gıdalardan uzak yerlerde , normal depolama şartlarında depolayınız. Bu şartlarda depolanan ilaç asgari 2 yıl spesifikasyonuna uygunluğunu muhafaza eder.

YANICIDIR.

Alevalma noktası asgari 65°C'dir.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmamasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇISI VE RUHSAT SAHİBİ :

Syngenta Crop Protection AG., Basle, İsviçre

İTHALATÇI :

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak No. 11

35100 Bornova / İZMİR

Telefon : (0232) 435 80 54

®- Syngenta şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

Dr. Ahmet ARSLAN
Büro Müdür Yardımcısı
19 Subat 2009

TARIM ve KÖYİŞİRE BAKANLIĞI
KORUMA VE FİTAN MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

A.Ş.

Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü

10