

Şarj no. :
Fiyat Tasdik Tarih ve No.:

syngenta

ENVOKE 75 WG

HERBİSİT (Yabancıot ilacı)
Suda dağılılabilen granül

% 75 ağı / ağı. **Trifloxysulfuron- sodium**:1-(4,6-dimethoxyimidin-2-yl)- 3-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylsulfonyl]urea

Siçanlarda Akut Oral LD₅₀ : > 5000 mg/kg

DİKKAT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, SİPERLİK KULLANINIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ
SİGARA İÇMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :
Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya ilçe ve ambalajı ile birlikte hastayı doktora götürünüz. Deriye veya elbiseye bulaşmışsa, elbiseyi çıkarınız, derinizi sabunlu su ile yıkayınız. Gözlere gelmesi halinde gözleri temiz bol su ile asgari 15 dakika yıkayınız. Eğer yutulmuşsa kusturmaya çalışmayınız. Baygın durumdaki hastaya ağızdan birşey vermeyiniz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ :
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezinin ücretsiz hattını arayınız

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) : 114



TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

16 Haziran 2009

Azami perakende satış fiyatı:
Ruhsat tarih ve no :

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ
OKUYUNUZ

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR:**

Kalan ilaç mahlülünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz. Balıklara ve sucul organizmalara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, eziniz, parçalayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajında, serin ve kuru bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta, kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden ayrı, çocukların ulaşamayacağı, kilitle, iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz. Normal şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
Syngenta Crop Protection AG.
Basle, İsviçre

İTHALATÇI:
Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Kazım Dirik Mah. 364 Sk. No.11
Bornova-İZMİR
Tel.: (0232) 435 80 54

Syngenta şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

İlacın özellikleri ve etki şekli :

ENVOKE 75 WG, pamukta, geniş yapraklı yabancıotlar ile bazı dar yapraklılara ve cyperaceae familyası üyesi yabancıotlara karşı çıkış sonrası olarak kullanılan seçici bir herbisittir. İlaç yabancı otların hem yaprakları ve hem de kökleri tarafından alınabilir. İlaç yabancıotlarda acetolactate enziminin sentezini (ALS) önler.

Kullanıldığı Bitkiler ve Kontrol Ettiği Yabancıotlar

Bitki Adı	Yabancıotlar	Kullanma Dozu
Pamuk	Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Kırmızı köklü horoz ibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	1 g / da (Çıkış sonrası)
	Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	2 g / da (Çıkış sonrası)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : Tarla ilaçlamalarında kullanılan klasik ilaçlama aletleri ile 2-3 atmosfer basınçla atılmalıdır. İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Dekara kullanılacak ilaça su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılmalı, harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaça su miktarı hesaplanmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-30 litre olmalıdır.

İlacın uygulamaya hazırlanması: ENVOKE 75 WG, suda dağılılabilen granül formülasyonundadır ve su ile kolayca karışır. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve karıştırılmaya başlanır. İlaçlanacak alan için gerekli ENVOKE 75 WG ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılarak tanka ilave edilir ve karıştırmaya devam edilir. Tankın geriye kalan kısmı su ile doldurularak tüm ilaçlama boyunca karıştırıcının çalışır durumda olmasına özen gösterilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ :

Uygulama Zamanı : Yabancı ot çıkışının erken döneminden geç dönemine kadar geniş bir zaman aralığında kullanılabilir. Ancak aktif gelişme halindeki yabancı otlara daha hızlı etki eder. Ekim öncesi veya ekim sırasında yapılacak Dual S Gold uygulamalarını takiben çıkış sonrası uygulanacak ENVOKE 75 WG uygulamasından daha iyi sonuç alınır.

Uygulama tekniği : ENVOKE 75 WG, traktöre monteli tarla pülverizatörleri veya sırt ilaçlama aletleri ile uygulanabilir. İlaçlamalar pamuğun alt gövde kısımlarına doğru yapılmalı, büyüme ve gelişme noktalarına gelmemesine özen gösterilmelidir. Uygulamadan 2 saat sonraki yağmurdan etkilenmez.

Sınırlamalar :

Seçicilik : Envoke 75 WG pamuk için emniyetli olmasına karşın, bazı çeşitlerde kısmi hassasiyet görülebilir. Bu nedenle ilaçlamanın yabancı otlara gelecek şekilde yapılması tavsiye edilir. Nemli ve serin koşullarda veya pamuğun gerçek yaprak sayısı 4'ten az olduğunda hassasiyet gösterebilecek çeşitlerde bazı sararmalar görülebilir, ancak bu durum geçici olup, 2-3 hafta içinde bu belirtiler ortadan kalkar. Pamuk veriminde herhangi bir olumsuzluk görülmez. Envoke 75 WG' nin, kuraklık, soğuk hava, hastalık ve zararlı baskısı gibi unsurlardan dolayı stres altında olan pamuklarda, bu ortam koşulları geçene kadar kullanılması tavsiye edilmez. İlacın yabancı otlar çıkmadan (pre - emergens) kullanımı da önerilmez.

DEVAMI ARKA SAYFADA

Dr. Ahmet Erciis
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

A. Şahin

SYNGENTA TARIM
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yardımcı

Dayanıklılık : Aynı etki mekanizmalı ilaçların aynı alanlarda sürekli olarak üst üste kullanılması dayanıklılık yönetimi açısından sakıncalıdır. Bu nedenle farklı etki mekanizmalarına sahip ilaçlar rotasyon halinde kullanılmalıdır.

Ürün rotasyonu : ENVOKE 75 WG ile ilaçlanmış pamuk tarlalarına, bir sonraki sezonda (yaklaşık bir yıl sonra) pamuk, mısır, soya fasulyesi ve çeltik ekilebilir. ENVOKE 75 WG ile ilaçlanmış pamuğun sel v.s. nedeni ile bozulması halinde aynı tarlaya ilaçlamadan 2 hafta geçmiş olması kaydı ile sadece pamuk ekilebilir.

Bitki tahammülü :

Önerildiği şekilde kullanıldığında ENVOKE 75 WG, tavsiye edildiği pamuk bitkilerince iyi bir şekilde tolere edilir.

Diğer ilaçlarla karışma durumu:

ENVOKE 75 WG 'nin , erken çıkış sonrası uygulamalarında diğer herbisitlerle karışımı tavsiye edilemez. Orta ve geç uygulamalarda bitki koruma ürünlerinin bir ögü ile uygulama zamanları doğru olmak kaydı ile tank karışımı şeklinde kullanılabilir. Çıkış sonrası dar yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılan fob e dim grubu ilaçlarla tank karışımı olarak kullanıldığında antagonistik etki görülebilir. Bu ilaçlar Envoke 75 WG uygulamasından 3 gün önce veya 7-10 gün sonra uygulanmalıdır. Karışıma girecek bitki koruma ürünleri ilaçlama tankına ayrı ayrı ilave edilmeli, karıştırıcı sürekli çalışır durumda olmalıdır. Hazırlanan karışım emen kullanılmalıdır. Tereddüt halinde ve büyük miktarlardaki karışımlarda üreticinin kendi sorumluluğunda bir ön deneme yapılması tavsiye edilir.

syngenta

ENVOKE 75 WG

HERBİSİT (Yabancıot ilacı)
Suda dağılılabilen granül

% 75 ağı / ağı. **Trifloxysulfuron- sodium:**1-(4,6-dimethoxyprimidin-2-yl)- 3-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylsulfonyl]urea

Sıçanlarda Akut Oral LD₅₀ : > 5000 mg/kg

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

16 Haziran 2009
Dr. Ahmet ARSLAN
Yardımcısı

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü