

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No. : 09.02.2006/5392

ETKİ ŞEKLİ :

FLAMBO EXTRA 315 EC geniş spektrumlu bir insektisittir. İki aktif madde içermektedir. Profenofos sistemik olmayan temas ve mide etkilidir. Bitki dokusuna hızlı girdiği için ilaçlamayı takiben yağışlardan çok az etkilenir. Lambda-cyhalothrin de sistemik olmayıp kuvvetli temas etkilidir. Ayrıca rezidüel etkisi vardır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR :

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son Kullanma ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Pamuk	Yeşilkurt (<i>Heliothis armigera</i>)	300 ml / da	14

ILAÇLAMA ZAMANI

Pamuk : 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğu anda ilaçlamaya karar verilir. Bırakılan yumurta sayısı arttığı sürece ilaçlama yapılmamalıdır. Ancak bu süre Yeşilkurt larvalarının çok fazla büyümesine imkan verecek kadar da uzun olmamalıdır.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI:

- * İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz.
- * Dekara kullanılacak ilaç su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgün bir şekilde ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaç su miktarı hesaplanır.
- * İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır.
- * Önce aletin deposu yarısına kadar suyla doldurulmalıdır. Daha sonra tavsiye edilen doz üzerinden hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kaptaki su ile karıştırılmalı ve bu karışım, aletin çalıştırıcısı da çalışır durumda iken tanka dökülmeli daha sonra tank hizasına kadar suyla doldurulmalıdır.

KARIŞIRILIRLIK : Diğer ilaçlarla karıştırılarak atılmaz.

syngenta

FLAMBO EXTRA 315 EC

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Emülsiyon Konsantré

300 g / l profenofos

0-4-bromo-2-chlorophenyl 0-ethyl S-propyl phosphorothioate

15 g / l lambda- cyhalothrin

(S) α -cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate + (R) α -cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1)

Sıçanlarda Akut Oral LD₅₀ : 56 mg/kg

ZEHİRLİ

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN, İÇECEKLERDEN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, SİPERLİK, MASKE KULLANINIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİĞARA İÇMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLAMADAN SONRA 14 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Deriye ve göze temas etmişse ilaçla bulaşık giysiler çıkarılmalı, vücudun ilaçla temas etmiş kısımları ve gözler bolca temiz su ile yıkanmalıdır. Zehirlenme şüphesi anında derhal işi bırakıp doktor çağırılmalıdır. İlacın solunması halinde hasta temiz havaya çıkarılmalıdır. Yutulma halinde derhal ilacın etiketi ile birlikte doktora gidilmelidir. Baygın durumdaki hastaya asla ağızdan bir şey verilmemeli, kusturmaya çalışılmamalıdır.

ANTİDOTU :

Doktor kontrolünde Toxogonin gibi oximli preparatlara ilaveten atropin (Doktor Kontrolünde)



Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Azami per. satış fiyatı :
T.K.B. Yazısının Tarih ve No'su :

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

EMNİYET TEDBİRLERİ :

- *İlacı kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- *İlacın deri, göz ve elbiselere bulaşmasından kaçınınız

UYGULAMA SIRASINDAKİ TEDBİRLER :

- *Bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız
- *Gözlük, maske kullanın, kimyasallara dayanıklı eldiven, tulum ve çizme giyiniz
- *Ağzınızı ve burnunuzu içine alan maske takınız.
- *İlaç gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine bakınız
- *İlaç buharlarını solumayınız.
- *Sulara bulaştırmayınız, balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar ile arılara yüksek oranda zehirlidir.

ILAÇLAMA SONRASI TEDBİRLER :

- *Boş ambalajı kesiniz, eziniz, yakınız veya gömünüz, tekrar kullanmayınız.
- *Kullanılmayan ilacı ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalarda uzakta, kilit altında saklayınız.
- *Yıkayınız. İş elbiselerinizi değiştiriniz ve yıkayınız.
- *Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER :

- *İlacı, orjinal ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.
- * + 35 °C nin üzerinde ve -5 °C nin altında depolamayınız.
- *İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orjinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

Firma, uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanılması-sından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ

ANKARA (0800) 314 79 00

İMALATÇI: Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Basel Switzerland

İTHALATÇI: Syngenta Tarım Sanayi ve Tic.A.Ş.

Kazım Dirik Mahallesi, 364 Sokak No: 11
Bornova / İZMİR Tel : (232) 435 80 54

SYNGENTA bir ZİMDİ üyesidir

© Syngenta Şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

Dr. Ahmet ERCİS
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

09 Subat 2006