

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No.
Fiyat Tasdik Tarih ve No.:

FUSILADE FORTE, geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Graminae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıktıktan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır.FUSILADE FORTE, ilaçlama ile hasat arası süreye uymak kaydı ile geniş yapraklı kültür bitkilerinin her döneminde kullanılabilir. İlaçlama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar.Daha önceden kültürel işlemlerle çok yıllık yabancı otların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı otlar	Kullanma Dozu ve dönemi	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)
Pamuk	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir	56
Soğan	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	50 ml/da yabancı yulafın kardeşlenme döneminde, 100 ml/da soğanın 2 yapraklı devresinde	28
Bağ	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	100 ml/da, kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken 150 ml/da, Köpekdişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken	28
Yeşil Mercimek Kırmızı Mercimek	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Kendi gelen hububat (<i>Triticum spp.</i>)	50 ml/da, bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi, yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken	56
Şeker Pancarı	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	100 ml/da, kanyaşlar 15-30 cm boyda iken 50 ml/da, yabancı yulafın kardeşlenme döneminde iken	56
Domates	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	75 ml/da, darıcanlar 10-12 cm boyda iken	28
Patates	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da, kanyaşlar 15-20 cm, darıcanlar 8-10 cm boyda iken	28
Kanola	Kendi gelen buğday (<i>Triticum spp</i>) İtalyan çimi (<i>Lolium multiflorum</i>)	50 ml/da, buğday 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda 100 ml/da, İtalyan çimi 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda	28

DEXAMI ARKA SAYFADA

Dr. Duran KOÇAK
Genel Md. Yrd.

syngenta FUSILADE® FORTE

syngenta
HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
Emülsiyon
Litrede 150 g fluzifop-p-butyl
(R)-2-(4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionic acid

Sıçanlarda akut oral LD₅₀: 2451 mg/kg

DİKKAT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
İLAÇLAMA SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ SİGARA İÇMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Zehirlenme belirtileri ilaca özel değildir. Mide bulantısı, kusmayla birlikte baş dönmesi ve baş ağrısı görülür. Bu belirtilere ilave olarak ishal de görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Zehirlenme veya rahatsızlanma halinde derhal işi bırakınız veya hastayı ilaçlanmış sahadan derhal uzaklaştırınız, kapalı alanda ise derhal açık havaya çıkarınız.

DERİYE temas etmişse ilaçla bulaşık giysiler çıkarılmalı, vücudun ilaçla temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır.

GÖZE temas halinde, göz kapakları açılarak gayet yavaş akan su ile gözler 15 dakika süre ile yıkanmalıdır.

SOLUNMUŞSA, temiz havaya çıkartılmalı, nefes alamıyorsa suni solunum yaptırılmalıdır. Derhal tıbbi yardım istenmelidir.

YUTULMUŞSA , hastayı kusturmayınız. Baygın hastaya hiç bir şey verilmez. Hastayı **ilaç ambalajı ile birlikte** derhal doktora götürünüz.

Net ve Brüt Ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Ruhsat tarih ve no :27.10.2000 / 3856

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE İLK YARDIM VE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- İlaç hazırlarken, uygularken, gözlük, ağızınızı ve burnunuzu içine alan maske ve siperlik kullanın, kimyasallara dayanıklı eldiven, koruyucu elbise (tulum) ve çizme giyiniz. İlaç ile temastan sakınınız. İlacın deri, göz ve elbiselere bulaşmasından kaçınınız. İlaç gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız, ilk yardım tedbirlerine bakınız. Derinize temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Elbisenize dökülmüş ise derhal değiştirin ve yıkayın. İlaç buharını kesinlikle solumayınız. İlaçlama sırasında ve sonrasında gerekli temizlikleri yapmadan hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.

- Boş ilaç ambalajlarını kesinlikle başka bir gaye için kullanmayınız, boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Kapalı alanlarda ilaç kalıntılarını ve döküntülerini derhal temizleyiniz. Balıklara zehirlidir, artan ilaç mahlülünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz, sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Kullanılmayan ilacı, ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, **çocukların erişemeyeceği bir yerde** ve gıdalardan uzakta, kilit altında saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

- İlaç, orjinal ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, **çocukların ve hayvanların erişemeyeceği** serin ve kuru bir yerde, **kilit altında** muhafaza ediniz.

- + 35 °C nin üzerinde ve -5 °C nin altında depolamayınız.

- İlaç imal tarihinden itibaren, normal depolama koşullarında, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orjinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zararlara katlanır. Firma, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

:Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, İsviçre

İTHALATÇI: Syngenta Tarım Sanayi ve Tic.A.Ş.

Kazım Dirik Mahallesi, 364 Sokak No: 11
Bornova / İZMİR Tel : (232) 413 00 55

© Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
MÜHÜRÜNE KONTROL GÖZÜNDEN
KABUL EDİLMİŞTİR

1 Şubat 2010

ETİKETİN DEVAMI

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu :

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Her türlü ilaçlama aleti ile uygulanabilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre kadardır.

Uygulamaya Hazırlanması : Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

Fusilade Forte, ilaçlamadan bir saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.

KULLANIM ŞEKLİ: İlaçlamada iyi bir kaplama için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için ilaçlama uygun basınçta (3 atmosfer) yapılmalıdır. İlaçlama için yelpaze memeler en uygun olanıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: FUSILADE FORTE, tavsiye edilen dozlarda gerektiğinde Karate Zeon, Bravo ve Pirimor ilaçları ile karışabilir. Büyük miktarlarda karışım yapmadan önce bir ön karışım testi yapılması önerilir. Bazı kültür bitkileri için yapılan özel tavsiyeler dışında geniş yapraklı yabancı otlara etkili diğer herbisitler ile karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu tip ilaçlar FUSILADE FORTE uygulamasından 7 gün sonra yapılmalıdır.

syngenta

FUSILADE® FORTE

syngenta

HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

Emülsiyon

Litrede 150 g fluzifop-p-butyl

(R)-2-(4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionic acid)

Sıçanlarda akut oral LD₅₀ :2451 mg/kg

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Simptomatik ve takviye edici tedavi uygulanmalıdır. **Gerektiğinde ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİ (UZEM): 114 arayınız.**



Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Biriki Koruma
Büro Müdürü

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1) Subat 2010

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR