

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No. :
Ruhsat tarih/No. : 28.03.1994/2713

GESAPRİM 500 SC birçok senelik ve bazı çok senelik yabancı otlara karşı kullanılır. Yabancı otların kökleri ile alınarak ve yapraklarına temas ile tesir eden selektif bir yabancı ot ilacıdır. İlaçlama için en uygun zaman, yabancı otların toprak yüzüne çıkmadan evvelki veya çıkmasından sonra ilk 2-3 yapraklı genç devreleridir. Selektif özelliği dolayısı ile mısır tarlalarında tercihen kullanılan Gesaprim'in bu alanda en uygun kullanma zamanı mısır ekiminden sonraki 1 haftalık devredir. Dekara 300 ml ilaç tatbik edilir. Yağmur veya ön sulama ilacın toprağa nüfuzunu ve tesirini çabuklaştırır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ OTLAR

Bitki adı	Yabancı ot	Kullanma dozu ve dönemi
Mısır	Horoz ibiği- <i>Amaranthus retroflexus</i> <i>Amaranthus albus</i> Köpek üzümü- <i>Solanum nigrum</i> Yabani hardal- <i>Sinapis arvensis</i> Sirken- <i>Chenopodium album</i> Semiz otu- <i>Portulaca oleracea</i> Darıcan- <i>Echinochloa colonum</i> Putrak- <i>Xanthium strumarium</i>	300 ml/dekar dozda, çıkış öncesi ve sonrasında kullanılır. Çıkış sonrasında mısırın 2-3 yapraklı genç devrelerinde uygulanır.

İlaçlama aleti nasıl ayarlanmalıdır:

Mücadelede esas, belirli alar tavsiye edilen miktardaki ilacı eşit olarak isabet ettirmektedir. Bunun için ilaçlama aletinin ayarlanması gerekir. Bu gaye ile ilk önce aletin deposu ağzına kadar suyla doldurulur. Sanki ilaçlama yapıyor muscasına gidilerek toprağa tatbik edilir. Böylece 1 depo su ile kaç dekarlık sahanın ilaçlandığı bulunmuş olur. Örneğin 1 depo 100 lt. su alsın ve bununla 4 dekar yer ilaçlansın 1 dekara 300 ml Gesaprim kullanılacak ise 4 dekar için aletin deposuna 1200 ml ilaç konmalıdır. İlacın hazırlanması Gesaprim 500 SC "akıcı sıvı" bir formülasyondur. Uygulamaya geçmeden evvel aletinizi yukarıdaki şekilde ayarlayınız. Tavsiye dozu üzerinden ilaçlanacak saha için hesap edilen ilaç ; aletin deposu yarısına kadar suyla dolu ve karıştırıcı da çalışır vaziyette iken doğrudan depoya boşaltılabilir. Sonra su seviyesi tamamlanır. İlaçlamaya geçmeden evvel, tüm memelerin düzgün çalışması temin edilmelidir.

DİKKAT

Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız !
İş bittikten sonra ilaçlama aletinizi, bol su ile yıkayınız.
Kaşabilirlik durumu
Başka ilaçlarla karşım halinde kullanılması tavsiye edilmez.

Gesaprim® 500 SC

syngenta

HERBİSİT

(Yabancı ot ilacı)
Suspansiyon Konsantre (SC)
Litrede 500 gram
atrazine = 2-chloro-4-ethylamino-6-iso-propylamino-s-triazine
ve ilgili bileşikleri ihtiva eder.
LD₅₀ atrazine: 1869 mg/kg.

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRERLERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVENİ, GÖZLÜK KULLANINIZ.
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ.
SİGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
Zehirlenme belirtileri :
İnsanlarda hiç zehirlenme vakası kaydedilmemiştir. Buna rağmen zehirlenmeden şüpheleniyorsa işi bırakın.
İlk yardım tedbirleri
Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alın. Doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürün.
Şayet ilaç yutulmuş ise ve hastanında bilinci yerinde ise kusturulur. Bol miktarda aktif kömür verilir. Baygın hastaya ağızdan hiçbirşey verilmez.
Tedavi ve ANTİDOTU
İlacın hazmedildiğinden şüphelenilirse mide ilık su ile yıkanarak (tuzlu su alınmasını takiben) boşaltılmalıdır.
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır



TARIM ve KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
KABUL EDİLMİŞTİR

03 TEM 2001



Net miktarı :
Brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Taram ve Köy İşleri Bakanlığı yazısının tarih/no.su :

Kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar

Kalan ilaç mahfûlüü kuyu, havuz, çeşme yaklakları ve akarulara dökmeyiniz. Balıklara zehirlidir. Boş kapları imha ediniz, başka maksatla kullanmayınız. İlaçlama esnasında ilacın bitişikteki ürünlerle sürüklenmemesine dikkat ediniz. Kuşlara, arılara zehirli değildir. İlaçlı yerde hayvan otlatmayınız ot almayınız.

Depolama durumu ve diğer bilgiler

İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı kilitli iyi havalandırılan yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz. - 5 °C'nin altında + 35 °C'nin üzerinde depolamayınız. Normal şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajlarında fiziki ve kimyevi vasıflarını asgari 2 sene muhafaza eder.

Kullanıcının dikkatine

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olamayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasıyla doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ

Ankara (0800) 314 79 00
İzmir (0232) 277 73 33

İmalatçısı : Syngenta Crop Protection AG., Basle İsviçre

İthalatçısı : Syngenta Taram
San. ve Tic. A.Ş.
Yıldız Posta Cad.
Dedeman İşhanı No. 48/2
80700 Esentepe-İstanbul
Tel : (0212) 2 88 44 14

© Syngenta AG, Basle Switzerland 'ın tescilli ticari markasıdır.

HIKMET DUNBAR

HIKMET SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48
Esentepe, 80700/İSTANBUL
Vergi Dairesi : Mecidiyeköy 6320141821

15 Mar 2001