

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No. :
Fiyat tasdik tarih ve no :

Kullanıldığı Bitkiler ve Kontrol Ettiği Zararlılar

Bitki adı	Zararlı adı	Dozu ve dönemi	Son ilaçlama ile hasat arası süre
Sebze	Baklagil tohum böcekleri (<i>Bruchus spp.</i>)	40 ml / da	7
	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 ml/ da (larva)	
	Bozkurt (<i>Agrotis spp.</i>)	40 ml/ da (larva) (ilaç yeşil aksam ve toprağa pülverize edilir)	
	Yeşil kurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 ml/ da (larva)	
Meyve	Ağaç kızkılcı (<i>Cossus cossus</i>)	80 ml/ 100 l su (genç larva dönemi)	7
	Elma iç kurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml/ 100 l su (larva, yumurta açılışını takiben 20 gün ara ile 5 ilaçlama)	
Armut	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	20 ml/ 100 l su (Taç yapraklar döküldükten sonra, 2. ve 3. nimf döneminde)	7
Antep fıstığı	Antep fıstığı psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	25 ml/100 l su (Yaprakların %20'si bulaşık olduğunda ilk ilaçlama yapılır)	7
Ayçiçeği	Yeşil kurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml / da	7
Süs Bitkileri	Nergis soğan sinekleri (<i>Eumerus narcissi</i> , <i>Merodon eques</i>)	80 ml/100 l su	7
Mısır	Mısır koçan kurdu (<i>Sesamia nonagrioides</i>)	30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama)	7
	Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama)	
Hububat	Süne (<i>Eurygaster integriceps</i>)	20 ml/da (1.-3. dönem) 30 ml/da (4.-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin)	7
Genel zararlılar	Çekirgeler (Locusts)	40 ml/da	7
Bağ	Salkım güvesi* (<i>Lobesia botrana</i>)	20 ml/100 l su (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır)	7
Dişbudak	Amerikan beyaz kelebeği (<i>Hyphantria cunea</i>)	25 ml/ 100 l su (genç larva dönemi)	-
Şeker pancarı	Yaprak kurtları (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Mamestra spp.</i> , <i>Plusia gamma</i>)	30 ml/da	7
	Pancar piresi (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	25 ml/da	
	Kalkan böcekler (<i>Cassida spp.</i>)	30 ml/da	
	Yaprak böceği (<i>Piesma maculata</i>)	30 ml/da	

* Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

DEVAMI ARKA SAYFADA

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

31 Mart 2009

syngenta Imperator® 25 EC

syngenta

İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
Emülsiyon

Litrede 250 g cypermethrin=(±) α.cyano-3-phenoxybenzyl
(±).cis.trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-
cyclopropanecarboxylate

Sıçanlarda akut oral LD 50 : 250 mg/kg

ZEHİRLİ

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN, İÇECEKLERDEN VE
HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜZ ETMEYİNİZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE SİPERLİK KULLANINIZ.

İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA
KULLANMAYINIZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLALAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI
SAHAYA GİREMEZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler; başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. İlaç ile temas deri ve göz tahrişine sebep olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

İLAÇ GÖZE BULAŞMIŞ İSE: Göz kapaklarını açarak gayet yavaş akan su ile 10-15 dakika yıkayınız. Derhal doktora başvurunuz.

EĞER İLAÇ YUTULMUŞ İSE hastanın bilinci yerinde ise kusturunuz. Baygın hastayı kusturmaya çalışmayınız. Ambalaj ile birlikte hastayı derhal doktora götürünüz. Mide muhteviyatının, nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezini arayınız : UZEM : 114



Ahmet ARSLAN

Net ve Brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Ruhsat tarih ve no. : 13.03.1978 / 1129

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR**

- İMPERATOR'u kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz, hiçbir şey yemeyiniz.

KARIŞTIRMA SIRASINDAKİ TEDBİRLER:

-Göz koruyucusu (en azından gözlük) kullanınız. Sulandırılmamış ilaç gözlerinizi tahriş edebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine bakınız.

-Sentetik lastik eldiven giyiniz. Sulandırılmamış ilaç derinizi tahriş edebilir. Eğer derinize bulaşmış ise hemen yıkayınız. Elbisenize dökülmüş ise, değiştirip hemen yıkayınız.

İLAÇLAMA SIRASINDAKİ TEDBİRLER:

-Bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız.

-Atomizör ile ve sisleme şeklinde ilaçlama yapılırken ağzınızı ve burnunuzu kapatacak bir maske takınız.

-Balıklara zarar vermekten kaçınmak için, su yollarına ilacı püskürtmeyiniz.

İLAÇLAMA SONRASI TEDBİRLER:

-Yıkayınız. İş elbiselerini değiştiriniz ve yıkayınız.

-Ambalaj boşalınca yıkayınız. Boş ambalajı tekrar kullanmayınız. Ezip veya kesip gömünüz.

-İlaç artıklarını sulara dökmeyiniz.

-Kullanılmayan, artan ilacı ambalajı içinde, ağız kapalı olarak, gıdalardan uzakta ve çocukların erişemeyeceği bir yerde, kilit altında saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

İlaç, orjinal ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.

+ 35 °C nin üzerinde ve -5 °C nin altında depolamayınız.

İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orjinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

ullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel , İSVİÇRE

İTHALATÇI FİRMA :

Syngenta Tarım Sanayi ve Tic.A.Ş.
Kazım Dirik Mahallesi, 364 Sokak No: 11
Bornova / İZMİR Tel : (232) 435 80 54

® Syngenta şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(Handwritten signature)

Dr. Ahmet Elçis
İlaçlar Dairesi Başkanı

ETİKET / DEVAMI

Kullanım şekli: Imperator 25 EC temas ve mide yoluyla zararlı böceklere karşı yüksek derecede etkilidir. Lepidopter larvalarına karşı yüksek etki alabilmek için larvalar küçük (1. ve 2. dönem) iken ilaçlama yapılmalıdır. Imperator 25 EC yer aletleri ile uygulanabilir. Tarla pulverizatörleri, yaprak altı memeleriyle kullanılmalıdır, ancak bu takdirde iyi bir kaplama yapılabilir. Zararlıının durumuna göre ilaçlamalar 7-21 günde bir tekrarlanmalıdır. Çok rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve bir kaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır.

Karışabilirlik Durumu: Imperator 25 EC ilacı Meteor, Anvil, Captan gibi birçok insektisit, akarisit, fungusit ve Berelex ile karışabilirse de büyük miktarlarda karışımlar hazırlanmadan önce basit ön karışım testleri yapılması tavsiye edilir.

syngenta Imperator® 25 EC

syngenta

İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
Emülsiyon

Litrede 250 g cypermethrin=(±) α.cyano-3-phenoxybenzyl
(±).cis.trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2.2-dimethyl-
cyclopropanecarboxylate

Sıçanlarda akut oral LD 50 : 250 mg/kg

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve FİTİYATİLE GELİŞTİRME BÜYÜKLERİ
KABUL EDİLMİŞTİR.

31 Mart 2009

Dr. Ahmet ARSLAN
Büro Müdür Yardımcısı

Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Bölge Koruma
Büro Müdürü

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.