

İmal tarihi
Son kullanma tarihi
Şarj No.
Ruhsat tarih ve no. : 01.10.2001 / 3998

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

İlacın özellikleri ve etki şekli :
LINTUR 70 WG, buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde çıkış sonrası (post-emergens) olarak kullanılan seçici suda dağılılabilen granül bir herbisittir. Toprak yüzüne çıkan yabancı otların hem yeşil aksamı hem de köklerinden alınır. Hassas yabancı ot türlerinde meristem doku gelişimini önler. Yabancı otlar üzerinde etkinliğin görülebilmesi için 15-20 gün geçmesi gerekir.

Kullanıldığı kültür bitkileri, kontrol ettiği yabancıotlar ve dozları :

Bitki	Kontrol ettiği yabancı otlar	Dozu (g / da)
Buğday	Kokerot (<i>Bifora radians</i>)	12.5 Çıkış sonrası (Post-em)
	Sarıot (<i>Boreava orientalis</i>)	
	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	
	Gökbaş (<i>Centaurea depresso</i>)	
	Köyğöçüren (<i>Cirsium arvense</i> (tohumdan))	
	Şahtere otu (<i>Fumaria officinalis</i> , <i>F. Anatolica</i>)	
	Kendi gelen mercimek (<i>Lens culinaris</i>)	
	Dilkanetan (<i>Galium aparine</i>)	
	Yağlı ot (<i>Gypsophila pilosa</i>)	
	Papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>)	
Arpa	Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>)	20 Çıkış sonrası (Post-em)
	Gellincik (<i>Papaver rhoeas</i>)	
	Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	
	Yabani bakla (<i>Vicia sativa</i> , <i>V. narbonensis</i>)	
	Kangal (<i>Silybum maritanum</i>)	
Arpa	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	12.5 Çıkış sonrası (Post-em)
	Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>)	
	Papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>)	
	Gellincik (<i>Papaver rhoeas</i>)	
	Dilkanetan (<i>Galium aparine</i>)	

İlaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresi 14 gündür.

Uygulama zamanı :

* LINTUR 70 WG, yabancı otlar çıktıktan sonraki dönemden buğday kardeşlenme sonuna kadar uygulanabilir. Ancak daha iyi sonuç almak için mümkün olduğunca erken uygulanması tavsiye edilir. Düşük sıcaklıklardaki uygulamalarda etkinliği kaybetmez. Sıcaklığın 20° C 'nin üzerinde olduğu günlerde ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu :

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alan düzğünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Dekara kullanılacak su miktarı 20 litreden az olmamalı ve düz yelpaze tipi meme kullanılmalıdır.

İlacın uygulamaya hazırlanması :

Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırmaya devam edilir. İlaçlama sırasında çevredeki ürünlere girmemesi, zarar vermemesi için dikkatli olunmalıdır.

DEVAMI 2. SAYFADA

syngenta

LINTUR® 70 WG

syngenta

HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

Suda dağılılabilen granül (WG)

Litrede :

% 65.9 dicam ba (Sodyum tuzu olarak formüle edilmiş) : 3,6-
dichloro-2-methoxy-benzoic acid dodium salt
% 4.1. triasulfuron : 2-(2-chloroethoxy) N- (4-methoxy-6-methyl-
1,3,5-triazin-2-yl) amino }carbonyl }-benzene

Sıçanlarda akut oral LD₅₀ : 1 707 mg/kg

DIKKAT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ

DERİ VE GÖZ TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ

SİGARA İÇMEYİNİZ

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI

SAHAYA GİREMEZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE

YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İnsanlarda zehirlenme belirtileri görülmemiştir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Zehirlenme veya rahatsızlanma halinde derhal işi bırakınız veya hastayı

ilaçlanmış sahadan derhal uzaklaştırınız, kapalı alanda ise derhal açık

havaya çıkarınız. İlaçla temas etmiş bulaşık elbiseler çıkarılmalı, vücudun

ilaçla temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.

DERİYE temas etmişse ilaçla bulaşık glyisler çıkarılmalı, vücudun ilaçla

temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır.

GÖZE temas halinde, göz kapakları açılarak gayet yavaş akan su ile gözler

15 dakika süre ile yıkanmalıdır.

SOLUNMUŞSA, temiz havaya çıkartılmalı, nefes alamıyorsa suni solunum

yaptırılmalıdır. Derhal tıbbi yardım istenmelidir.

YUTULMUŞSA , hastayı kusturmuyunuz. Baygın hastaya hiç bir şey verilmez.

Hastayı ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz.

TEDAVİ ŞEKLİ : Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat

edilerek mide yıkanmalıdır. Simptomatik ve laktiyte edici tedavi

uygulanmalıdır.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Zehirlenme halinde zehir danışma merkezine başvurunuz.

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ

Ankara (0800) 314 79 00

TARIM ve KÖYLÜLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

23 Ocak 2006
H. Hüseyin POLAT
Genel Müdür Yardımcısı

Net Miktarı :
Brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Tarım ve Köylüleri Bakanlığı :
Yazısının Tarih ve No.su :

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE İLK YARDIM VE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

GENEL TEDBİRLER :

*İlacı hazırlarken, uygularken, ilaçlama sonrası gerekli temizlikleri yapmadan hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.

*İlaç ile temastan sakınınız ilacın deri, göz ve elbiselere bulaşmasından mutlaka kaçınınız. İlaç gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız, ilk yardım tedbirlerine bakınız. Derinize temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Elbiselerinize dökülmüş ise derhal değiştirin ve yıkayın.

*İlaç buharını kesinlikle solumayınız.

*Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

*Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

UYGULAMA SIRASINDAKİ TEDBİRLER :

*Gözlük, ağızınızı ve burnunuzu içine alan maske ve siperlik kullanın, kimyasallara dayanıklı eldiven, koruyucu elbise (tulum) ve çizme giyiniz.

*İlaçlama sırasında ilacın çevredeki kültür bitkilerine sürüklenmemesine azami gayret gösterilmelidir. Bunun için rüzgarı arkanıza alarak ilaçlama yapınız.

İLAÇLAMA SONRASI TEDBİRLER :

*Aritan ilacı ağaç kenarlarına veya diğer kültür bitkilerine ulaşacak şekilde dökmeyiniz. Bu gibi yerlerde ilaçlama aletini boşaltmayınız.

*Boş ilaç ambalajlarını kesinlikle başka bir gaye için kullanmayınız, boş ambalajı kesmek, ezmek veya gömmek sureti ile imha ediniz.

*Kapalı alanlarda ilaç kalıntılarını ve döküntülerini derhal temizleyiniz. İlaç döküntülerini usulüne uygun olarak imha etmek için kapalı bir kap içine alınız.

*Aritan ilaç mahlülünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.

*Kullanılmayan ilacı, ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalardan uzakta, kilit altında saklayınız.

*Elinizi, yüzünüzü ve gözlerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız. İş elbiselerinizi derhal değiştiriniz ve yıkayınız.

*Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız.

*Yeni ilaçlanan alanlarda 24 saatten önce hayvan otlatılmamalı, evcil hayvanların buralara girmesine izin verilmemelidir.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER :

*İlacı, orjinal ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.

* + 35° C nin üzerinde ve -10° C nin altında depolamayınız.

*İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orjinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zararlara katlanı. Firma, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI: Syngenta Crop Protection AG CH-4002 Basel, Switzerland

İTHALATÇI: Syngenta Tarım Sanayi ve Tic.A.Ş.

Kazım Dirik Mahallesi, 364 Sokak No: 11

Bornova / İZMİR Tel : (232) 435 80 54

SYNGENTA bir ZİMİD üyesidir.

© Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır.

Dr. Ahmet ERCİS
Ankara Birki Koruma
Büro Müdürü
SYNGENTA TARIM
ANAYI VE TİCARET A.Ş.

syngenta

LINTUR® 70 WG

syngenta

HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

Suda dağılılabilen granül (WG)

Litrede :

% 65.9 dicamba (Sodyum tuzu olarak formüle edilmiş) : 3,6-dichloro-2-methoxy-benzoic acid sodium salt

% 4.1. triasulfuron : 2-(2-chloroethoxy) N- (4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl) amino }carbonyl }-benzene

DİKKAT**İlaçlama aletinin temizlik işlemi :**

Daha sonra ilaçlama yapacak kültür bitkilerine zarar vermemek için ilaçlamadan hemen sonra ilaçlama aleti ve koruyucu ekipman iyice temizlenmelidir. İlacın eseri miktarının dahi aletten temizlenmesine büyük özen gösteriniz. Aşağıdaki tavsiyelere kesinlikle uyulmalıdır:

-İlaçlama alet sistemini iyice süzdürerek boşaltınız. Birkaç dakika süreyle aletin tankını, ilaçlama çubuğunu ve memelerini temiz su ile yıkayınız, çalkalayınız.

-Aletin deposuna dörttebir (çeyrek) seviyesine kadar temiz su koyun ve bunun üzerine 200 litre suya 1 litre hesabı ile çamaşır suyu (%5.2 'lik sodyum hipoklorit) ilave ediniz. Hortumları, ilaçlama çubuğunu çalkalayın ve karıştırıcı faal durumda iken bu mahlülü 15 dakika süreyle aletin deposunda tutun, sonra memeler kanalı ile bu mahlülü boşaltınız.

-Aleti çamaşır suyundan iyice arındırmak için tankı temiz su ile iyice çalkalayınız ve memeler vasıtasıyla bu suyu dışarı atınız.

-Memeler ve süzgeçler çıkarılmalı ve koruyucu ekipman ile birlikte ayrıca temizlenmelidir.

SINIRLAMALAR :

-Buğday dışındaki ürünler, LINTUR 70 WG 'nin topraktaki düşük konsantrasyonlarına dahi hassas olabilir.

-LINTUR 70 WG, buğday/buğday, buğday/nadas, arpa/arpa, arpa/nadas, buğday/arpa, arpa/buğday alanlarında kullanılması tavsiye edilir.

-LINTUR 70 WG uygulamasını takip eden yılda her çeşit hububat (buğday, arpa, yulaf) bir kısıtlama olmaksızın ekilebilir.

-LINTUR 70 WG kuraklık zararı çeken, su basmış, hastalık ve böcek zararına uğramış buğday tarlalarında uygulanmamalıdır.

-LINTUR 70 WG, serbest kireç ihtiva eden tarlalarda uygulanmamalıdır.

Diğer ilaçlarla karışma durumu :

Diğer ilaçlarla veya gübreli ve kimyasallarla karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

23 Ocak 2006

H. Hüseyin POLAT
Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Birikim Koruma
Büro Müdürü

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.