İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Fiyat tasdik tarih ve no:

ETKİ ŞEKLİ : Lufenuron, benzoylurea grubundan kitin sentezi inhibitörü bir ilaç olup yumurta ve larva etkilidir. Fenoxycarb ise karbamatlardan olup böcek gelişimini düzenleyici (IGR) bir insektisittir. Yumurtalara penetre edip embriyoyu öldürürken L5 dönemindeki pupa olmaya hazırlanan larvalar tarafından kontak veya mide yoluyla alınır ve pupa oluşumunu engeller. Lufenox 105 EC ile temas eden salkım güvesi erginlerinin bıraktığı yumurtalar da sterildir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR :

Bitki adı	Zararlı adı	Kullanma dozu ve dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ	Salkım Güvesi *(Lobesia botrana)*	100 ml / 100 l suya Yumurta ve larva dönemi	21 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :
İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu :
* İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır.
Uygulamaya Hazırlanışı :
Önce aletin deposu yarısına kadar suyla doldurulmalıdır. Daha sonra tavsiye edilen doz üzerinden hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kapta su ile karıştırılmalı ve bu karışım, , aletin çalıştırıcısı da çalışır durumda iken tanka dökülmeli daha sonra tank hizasına kadar suyla doldurulmalıdır.

İLAÇLAMA ZAMANI :
BAĞDA SALKIM GÜVESİ : LUFENOX 105 EC ' den en yüksek etki, yumurtaların bırakılmasından hemen önce yapılan uygulamalardan alınır. LUFENOX 105 EC, yumurtaların bırakılmasından hemen önceki dönemden - ilk larva çıkışına kadar güvenle kullanılabilir. Her döl için bir uygulama yeterlidir. Bir mevsimde iki kereden fazla kullanmayınız. İpek böceğinin beslenmesi için yetiştirilen dut ağaçlarının en az iki km yakınında bu ilacı kullanmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :LUFENOX 105 EC birçok standart insektisit ve fungisit ile karışabilir. Büyük miktarda karışımlardan önce fiziki karışabilirlik testlerinin yapılması önerilir.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Kontrol ve Kontrol Genel Müdürlüğü
KABUL EDİLMİŞTİR
04 Haziran 2009

syngenta

LUFENOX 105 EC

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
Emülsiyon Konsantre

Litrede 30 g Lufenuron : (RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropro-poxy) phenyl]-= 3-(2,6-difluorobenzoyl)urea(IUPAC) +
Litrede 75 g Fenoxycarb : ethyl 2-(4-phenoxyphenoxy)ethylcarbamate

Sıçanlarda Akut Oral LD_{50}: > 2000 mg/kg

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ,
SİGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇINIZ
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Deri ve gözde tahrişe neden olabilir.Deri ile temas ettiğinde duyarlılığa yol açabilir.
İLKYARDIM TEDBİRLERİ :
GENEL: Rahatsızlık hissedildiğinde hasta iyi havalandırılmış bir yere alınmalıdır.Zehirlenme şüphesi durumunda derhal bir doktor çağırılmalıdır
GÖZE temas etmişse temiz su ile gözler yıkanmalıdır. YUTULMUŞSA tekrar tekrar bol miktarda su ile tıbbi kömür uygulaması yapılmalıdır. Baygın durumdaki hastaya ağız yoluyla hiçbirşey verilmemelidir. Hasta kusturulmaya çalışılmamalıdır.
DERİYE temas etmişse ilaçla bulaşık giysiler çıkarılmalı, vücudun ilaçla temas etmiş kısımları, saçlar ve tırnak altları dahil sabun ve suyla yıkanmalıdır.
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur belirtilere göre tedavi uygulanır.

Gerektiğinde ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİ (UZEM) arayınız: **UZEM : 114**

Dr. Durali KOÇAK
Genel Müd. Yrd.

Net ve Brüt Ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Ruhsat Tarih ve No. : 11.05.2004 / 4675

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
*Ağzınızı ve burnunuzu içine alan maske takınız.
*Kimyasallara dayanıklı eldiven, tulum ve çizme giyiniz.
*Arılara zararlı olabilir; çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
*İlaçlama yapılacak bitkilerin altı otlu ise ve bu otlar çiçeklenme döneminde ise, ilaçlamadan önce çiçeklerin üzerini ot veya saman ile kapatınız.
*Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir.
*Her türlü su kaynağına; göl, akarsu vs'ye bulaştırmayınız.
*Boş ambalajı kesiniz, eziniz,yakınız veya gömünüz,tekrar kullanmayınız.
*Kullanılmayan veya artan ilacı ambalajı içinde, ağzı sıkıca kapalı olarak **çocukların erişemeyeceği bir yerde** ve gıdalardan uzakta,kilit altında saklayınız
*Yıkanınız. İş elbiselerinizi değiştiriniz ve yıkayınız.
*Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız
DEPOLAMA DURUMU :
*İlacı, orjinal ambalajı içinde, ağzı sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz
+35 °C nin üzerinde ve -10 °C nin altında depolamayınız.
*İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orjinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI : Firma, uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ :
Syngenta Crop Protection AG, CH-4002
Basel,İsviçre
İTHALATÇI FİRMA:
Syngenta Tarım Sanayi ve Tic.A.Ş.
Kazım Dirik Mahallesi, 364 Sokak No: 11
Bornova / İZMİR Tel :(232) 413 00 55

® Syngenta Şirketler topluluğunun tescilli ticari markasıdır.

SYNGENTA TARİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Bitki Koruma Büro Müdürü