

ETİKETİN DEVAMI

Yerfıstığı: Uygulamalar yerfıstığı ilaçlamalarına uygun profesyonel ilaçlama ünitelerine sahip işletmelerde yapılabileceği gibi üretici şartlarında 100 kg Yerfıstığı tohumunun plastik bir örtü üzerine serilerek, 400 ml ilaç , 600 ml su ile karıştırılıp bu 1 litrelik ilaçlı suyun tohumlar üzerine bir el pülverizatörü yardımıyla yeknesak bir şekilde püskürtülmesi ile de yapılabilir. Kaplamanın yeknesak olması için ilaçlama sırasında tohumlar kabukları zedelenmeyecek şekilde hafifçe karıştırılmalıdır. Tohumlar kurduktan sonra aynı gün ekilmelidir.

Biber , Domates ve Tütün : Fide kök çürüklüğü mücadelesinde fideler toprak yüzeyine çıkınca ilaçlama yapılır. İlaçlamada m²'ye 4 litre su ile biber ve domateste 10 ml, tütünde 7.5 ml ilaç atılır.

Muz : Fusarium solgunluğu mücadelesinde fidelerin dikim sırasında ilaç , dekara 1000 ml gelecek şekilde can suyu ile birlikte verilir.

Bitki tahammülü : Tavsiye edilen şekilde kullanıldığında Maxim XL 035 FS tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Nötr reaksiyonlu diğer tohum ilaçlarının "WS" veya "FS" formülasyonlarıyla karışım halinde kullanılabilir.

syngenta MAXIM® XL 035 FS

syngenta

FUNGİSİT (Mantar ilacı)

Akıcı Sıvı Tohum ilacı formülasyonu(FS)

Litrede,

25 g Fludioxonil= 4-(2,2-difluro-1,3-benzodioxol-4-yl)- 1H-pyrole- 3- carbonitrile +

10 g Metalaxyl-M= (R) -2-[2,6-dimethyl-phenyl)-methoxy- acetylamino] propionic acid methylester

Sıçanlarda akut oral LD₅₀ : 633 mg/kg

28 Mayıs 2010

Dr. Ahmet ARSLAN
Genel Müdür Yardımcısı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.