

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No. :  
Fiyat Tasdik Tarih ve No. :

#### İlacın özellikleri

Neoron 500 EC temas yolu ile etki eden uzun tesirli özel bir kırmızı örümcek ilacıdır. Beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için bitki ilacli mahlul ile " kaplama " şeklinde iyice ilaçlanmalıdır. NEORON 500 EC, spesifik akarisit olup sadece akar sorunu olan yerlerde kullanılır.

#### KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

Bitki adı	Zararlı adı	Kullanma dozu ve dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Meyve Ağaçları	İki noktali kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus urticae</i> ) Avrupa kırmızı örümceği ( <i>Panonychus ulmi</i> ) Kahverengi örümcek ( <i>Bryobia rubrioculus</i> ) Akdiken akarı ( <i>Tetranychus viennensis</i> ) Yassı akar ( <i>Cenopalpus pulcher</i> )	100 ml / 100 l su (yaz mucedesinde kullanılır.)	21 gün
Sebze	İki noktali kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus urticae</i> ) Kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> )	100 ml / 100 l su	14 gün
Turunçgiller	Pas böcüsü=uyuz ( <i>Phyllocoptrata oleivora</i> ) Kırmızı örümcek ( <i>Panonychus citri</i> )	50 ml / 100 l su	21 gün
Bağ	İki noktali kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus urticae</i> )	100 ml / 100 l su	21 gün
Pamuk	Kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus spp.</i> )	100 ml / da (Ege Bölgesinde)	21 gün
Çilek	Kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus spp.</i> )	100 ml / 100 l su	21 gün
Yer fıstığı	Kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus spp.</i> )	200 ml / da	21 gün

- 1) İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :** Yüksek veya alçak hacimde su kullanan her türlü ilaçlama aletiyle atılabilir. İlacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir. **İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu :** İlaçlamadan önce, aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilacli su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilacli su miktarı hesaplanır. **İlaçın Hazırlanması :** Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlacli mahlul her zaman çok iyi karıştırılmalı ve bir kaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilacli mahlul hazırlanmamalıdır.
- 2) KULLANIM ŞEKLİ :** Kullanırken bitkilerde iyi bir kaplama yapmasına, yaprakların alt kısımlarının da ilaçlanmasına özen gösteriniz. Bazı taş çekirdekli meyvelerde, özellikle erikte tavsiye edilmez. **Bitki tahammülü :** Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında bu bitkilerce iyi tolere edilir.
- 3) KARIŞABİLİRLİK DURUMU :** Bir çok ilacli karışabilir. Büyük oranda karışım yapılmadan önce az miktarlar ile bir ön karışım denemesi yapılmalıdır.

syngenta

Neoron® 500 EC

syngenta

AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)  
Emülsiyon Konsantré

Litrede 500 g bromopropylate = (isopropyl-4,4 dibromobenzilate )

Siçanlarda akut oral LD<sub>50</sub> > 5 000 mg/kg.

**DİKKAT**

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ  
EVDE KULLANMAYINIZ  
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, SİPERLİK GÖZLÜK  
KULLANINIZ  
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ  
İLAÇLAMA SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA  
İÇMEYİNİZ  
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ  
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

İnsanlarda zehirlenme vakasına rastlanmamıştır. Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Cilt ve göze değerse derhal bol su ile yıkayınız. Teneffüs edilir ise temiz havaya çıkınız. İlacla bulaşık giysilerinizi çıkartınız. Ciltte tahriş varsa tıbbi yardım isteyiniz. Göze bulaşması halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Yutulması halinde tıbbi yardım isteyiniz, hastayı ilaç ve ambalajı ile birlikte doktora götürünüz  
**ANTİDOTU VE TADAVİSİ :**  
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) ücretsiz hattını arayınız ; UZEM : 114



28 Nisan 2008

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  
KORUMA ve KONTROL  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Net ve Brüt Ağırlığı :  
Azami Perekende Satış Fiyatı :  
Tarım ve Köyüşleri Bakanlığı  
Ruhsat Tarih ve No. :21.04.1986 / 1887

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET  
TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

İlaç artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilacli kirletmeyiniz. Bu ilacli balıklara ve arılara zehirlidir. Arıların ilaçlama sahasında aktif olarak gıda topladığı devrede kullanılmamalıdır. Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı, yem ve gıda maddesi toplanmamalı, evcil hayvanlar burardan uzak tutulmalıdır. Yem ve gıda maddeleri kirletilmemelidir. Boş ambalajları başka bir gaye ile özellikle gıda maddesi ve yem muhafaza etmek için kullanmayınız. İlacli cild, göz ve elbiselere değdirmeyiniz. Buharını teneffüs etmeyiniz. Herhangibirşey yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce el ve yüzünüzü yıkayınız. Eğer rahatsızlık hissedilir ise işi bırakın ve ilk yardım tedbirlerini alın. İş esnasında tulum, şapka ve ayakkabı giyiniz. Şayet elbise, vücut yoğun şekilde kirlenmiş ise işi durdurun, elbiseleri deęiştirin ve bunları tekrar kullanmadan önce yıkayın, koruyucu ekipmanı tekrar kullanmadan önce temizleyin

#### DEPOLAMA DURUMU :

İlacli güneş ve rutubetten uzakta, orjinal, sıkıca kapalı ambalajında iyi havalandan yerde yem ve gıda maddelerinden uzakta kilit altında muhafaza ediniz. + 35 °C üzerinde depolamayınız. Bu ilacli normal şartlar altında açılmamış orjinal ambalajında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

#### YANICIDIR

#### FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelen zarara katlanılır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasıyla doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

#### İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

Syngenta Crop Protection AG, CH-4002  
Basel , İSVİÇRE  
İTHALATÇI FİRMA :  
Syngenta Tarım Sanayi ve Tic.A.Ş.  
Kazım Dirik Mahallesi, 364 Sokak No: 11  
Bornova / İZMİR Tel : (232) 435 80 54

® Syngenta Şirketler topluluğunun tescilli ticari markasıdır.

SYNGENTA TARIM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dr. Ahmet ERCİS  
Ankara Bitki Koruma  
Büro Müdürü