

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj no. :
Fiyat tasdik tarih ve no :

Kullanıldığı Bitki ve kontrol ettiği yabancıotlar

Bitki	Yabancı otlar	Kullanma dozu ve dönemi
Çeltik	Darıcan(<i>Echinochloa crus-galli</i>) Dipotu (<i>Potamogeton pectinalus</i>) Kaşık otu (<i>Alisma plantago-aquatica</i>)	500-600 ml/da Ekim öncesi veya çıkış sonrası uygulanır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya suyla doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Bu şekilde hazırlanan ilaçlama mahlulü ekim sonrası veya öncesi olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Ekim öncesi : ORDRAM 6E çeltik ekiminden önce tavsiye edilen dozda keseksiz toprak sathına traktör kuyruk milinden hareketli pülverizatör ile dekara 20-40 litre ilaçlısu isabet edecek şekilde uygulanır.

İlaç, tatbikattan hemen sonra toprağın 5-6 cm derinliğine diskaro ile karıştırılmalıdır. Bunun temini için diskaronun 10-12 cm derinliğe batırılması gerekir. Ara bölmeler çekildikten sonra tavalara 3 gün içinde su verilmelidir. Akabinde bilinen tarzda çeltik ekimi yapılır. Ekim öncesi tatbikatta ve ağır topraklı tarlalarda ilacın yüksek dozu kullanılmalıdır.

Ekim sonrası : Birinci kurutmadan sonra ve Darıcan otlarının çoğunluğunun 5-8 cm olduğu devreden geç olmamak üzere su dolu tavalara motorsuz sırt tulumbası ile belirtilen belirtilen dozda ilaç beher dekara isabet edecek şekilde atılır. Bu tarz ilaçlamada en önemli husus, tavalar önce darıcanları örtecek şekilde su ile doldurulur, tatbikat su içinde yapılır. İlaçlamadan sonraki 3 gün içinde su seviyesi tavalarda muhafaza edilmelidir. Su çıkışları kapatılarak ilaçlı suyun aynı tavada kalması sağlanır ve böylece ilacın toprağa geçmesi temin edilmiş olur.

İlaçlamalarda dikkat edilecek hususlar :

Mümkün olduğu kadar az sayıda kurutma yapılabilirse ilacın tesir süresi uzatılmış olur. Bunun için tarla iyi şekilde hazırlanmalıdır. ORDRAM 6E yapı itibarıyla topraktan ve yabancıota kökünden tesir ettiği için çevre koşullarına bağlı olarak ilacın etkisinin görülmesi 1-2 hafta sürebilir.

ORDRAM 6E su ile birlikte çalışır. Tarla sathından su seviyesini gerektiğinde düşürmeli fakat tarla kuru kalmamalıdır. Önceden cimplendirilen çeltik tohumuna ilacın hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

KARIŞILIRLIK DURUMU :

Propanil ve bensulfuron-methyl ile karıştırılabilir. (bu ilaçların etiketlerinde yazılı dozları aşmamak koşulu ile).

İMAL

syngenta

ORDRAM® 6 E

syngenta

HERBİSİT (Yabancıot ilacı)
Emulsiyon Konsantré
Litrede 720 g Molinate
S-ethyl azepane-1-carbothioate

Siçanlarda akut oral LD₅₀ : 369 mg/kg

ZEHİRLİ

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN, İÇECEKLERDE VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELĐVEN VE KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA İÇMEYİNİZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Zor nefes alma, salya, gözyaşı salgılama, depresyon, titreme, vücut hareketinde karışıklık, halsizlik, zoraki terleme, aşırı idrar.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Deriye bulaşmışsa bol sabunlu su ile yıkayınız. Göze bulaşmış ise en az 15 dakika süre ile bol su ile yıkayınız. Yutulmuşsa kusturmaya çalışmayınız. Rahatsızlık hissedilir ise işi bırakınız. Temiz havaya çıkınız. İlaçla daha fazla temas etmeyiniz. Tüm iş elbiselerinizi çıkarınız. Gerektiğinde doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ : Mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına özen göstererek mideyi yıkayınız. Sonra semptomatik tedavi uygulayınız. Antidotu Atropin'dir. PAM veya Toxogonin kullanmayın.

Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezini arayınız : UZEM : 114



19 Subat 2009

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR EDİLMİŞTİR

Net ve brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı:
Ruhsat tarih ve no. : 15.03.1993 / 2622

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET ÖNERİLERİNİ OKUYUNUZ

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- ORDRAM 6E, BİR TIYOKARBAMAT bileşiği olan MOLİNATE ihtiva eder.

Eğer bir doktor size organik fosforlu karbamat veya tiyokarbamat terkipli ilaçlarla çalışmamanızı söylemiş ise bu ilacı kullanmayınız.

- Bu ilacı kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz ve hiçbir şey yemeyiniz.
- Balıklara zehirlidir.

Karıştırma sırasındaki tedbirler:

- Göz koruyucu kullanın (en azından gözlük). Sulandırılmamış ORDRAM 6E gözlerinizi tahriş edebilir. Gözünüze geldiğinde onu hemen yıkayınız. İkyardım tedbirlerine bakınız.

- Sentetik lastik eldiven giyiniz. Sulandırılmamış ORDRAM 6E derinizi tahriş edebilir. Eğer derinize bulaşmış ise hemen yıkayınız. Elbiselerinize dökülmüş ise değiştirip hemen yıkayınız.

İlaçlama sırasındaki tedbirler:

Bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız.

İlaçlama sonrasında alınması gereken tedbirler.

- Yıkayınız. İş elbiselerinizi değiştirin ve yıkayınız.
- Boş ambalajı kesiniz, eziniz, yakınız veya gömünüz; tekrar kullanmayınız.

- İstenmeyen ORDRAM 6E' yi sulara dökmeyiniz.

- Kullanılmayan ORDRAM 6E' yi ilaç şişesi içinde ağzı sıkıca kapalı olarak çocuk-ların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalardan uzakta kilit altında muhafaza ediniz

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağzı iyice kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.

İlacı 0 °C nin altında +35 °C nin üzerinde depolamayınız. İyi havalandırılan, güneş almayan ve rutubetsiz depo şartlarında muhafaza ediniz.

İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda depolandığında özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI

İmalatçı, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇISI :

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak No. 11
35100 Bornova / İZMİR
Telefon : (0232) 435 80 54

®-Syngenta şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(Handwritten signature)

Dr. Ahmet ERÇİŞ
Aukara Bitki Koruma
Büro Müdürü