

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj no :

PERGADO MZ, mandelamide sınıfı yeni bir fungusittir. Bileşimindeki mancozeb geniş bir etki spektrumuna sahip olup rezidüel koruyucu özelliğindedir. Bitki yüzeyinde koruyucu bir engel oluşturur ve spor çimlenmelerini engeller. Mandipropamid ise mildiyö gibi önemli ekonomik kayıplara neden olan oomycetes grubu funguslara karşı etkilidir. Spor çimlenmesi üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğu gibi miseliyal gelişimi ve sporulasyonu da etkiler. Ayrıca inkubasyon periyodunda tedavi edici özellik de gösterir.

Kullanıldığı Bitkiler ve Kontrol Ettiği Hastalıklar

Bitki adı	Hastalık adı	Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g / da	7
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g / da	7
Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	250 g / 100 l su	35
Soğan	Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	250 g / da	14

Bitki tahammülü : Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, PERGADO MZ 'nin tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur.

Uygulama Zamanı :

Patates : İlaçlamaya hastalık koşulları oluştuğunda ve hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır ve 7-10 gün aralıklarla devam edilir.

Domates : İlaçlamaya hastalık koşulları oluştuğunda ve çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Havaların sıcak ve kuru geçtiği yerlerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, yağışlı yerlerde ise birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ : Tahmin ve uyarı sistemlerinin uygulanmadığı yörelerde mücadeleye hastalık görülmeden önce başlanmalıdır. 1. İlaçlama sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında yapılmalıdır. Hastalık için koşullar uygun olduğu takdirde 10-12 gün aralıklarla 2. ve diğer ilaçlamalara devam edilmelidir. Hastalık için uygun koşullar ortadan kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyarı istasyonlarının bulunduğu yörelerde ise ilaçlamalar için yapılacak bilgilendirmeler dikkate alınmalıdır.

Soğan : Günlük ortalama sıcaklık 16 °C ve orantılı nem % 80 olduğunda ya da çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamalara başlanmalıdır. Hastalık koşulları devam ediyorsa ilaçlamalara 10 gün aralıklarla devam edilmelidir. Yaprakların kaygan ve mumlu olması nedeniyle yapıştırıcı ile birlikte kullanılmalıdır.

Uygulama tekniği : Yeşil aksamın ilaçla iyi bir şekilde kaplanması için yeterli su kullanılmalı, ancak ilaçla mahlülün yapraklardan yıkanması meydan verilmemelidir.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın uygulamaya hazırlanma şekli :

Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kaptan önce karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

Karışılabilirlik durumu :

Belirtilen mahsüllerde kullanılan fungusit, insektisit, akarisit ve bitki besin preparatlarının çoğu ile karışılabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışılabilirlik testi yapılmalıdır.

syngenta



pergado™ MZ

FUNGİSİT (Mantar İlacı)

İslanabilir granül (WG)

50 g/kg **Mandipropamid** : 2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide

600 g/kg **Mancozeb** : Çinko tuzu ile manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) kompleksi

Siçanlarda akut oral LD₅₀ : > 5 000 mg/kg

DİKKAT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, SİPERLİK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ,

SİGARA İÇMEYİNİZ

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI

SAHAYA GİREMEZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanıcının emniyeti

Yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce elinizi ve yüzünüzü yıkayınız.

İş bittikten sonra elbiselerinizi değiştiriniz ve tüm vücudunuzu yıkayınız. Tekrar kullanmadan önce iş elbiselerinizi yıkayınız. Eğer bir rahatsızlık hissedilir ise hemen işi bırakınız ve doktor çağırınız.

Zehirlenme belirtileri

İnsanlarda zehirlenme vakası görülmemiştir.

İlk yardım Tedbirleri

Rahatsızlık hissedilir işi bırakınız. İlaçla daha fazla temas etmeyiniz. Cilde teması halinde, ilaçla bulaşık giysileri çıkarınız. İlaç değen kısımları sabunlu su ile iyice yıkayınız. Göze bulaşmışsa temiz, bol su ile asgari 15 dakika çalkalayınız. Şayet ilaç yutulmuş ise hastayı kusturmayınız, doktor çağırınız veya ilaç etiketi ile birlikte hastayı doktora götürünüz. Baygın hastaya kesinlikle ağızdan birşey vermeyiniz.

ANTİDOT

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır



Brüt ve net ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Ruhsat tarih ve no. : □08.08.2007 - 6104

Çevre ve yaban hayatı

Balıklara zehirlidir. Sulama ve dahili işlerde kullanılan suları, akar ve durgun su sahalarını, drenaj sistemlerini ilaç atıklarıyla veya ilacın hedef dışına sürüklenmesi ile kirlitemeyiniz. Tüm evcil hayvanları ilaçlanacak sahadan uzak tutunuz. Gıda ve yem maddelerini ilaç ile kirlitemeyiniz.

Depolama

İlacı serin ve kuru yerde, kilit altında, orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak yerlerde, normal depolama şartlarında muhafaza ediniz. +35° C'nin üzerinde depolamayınız. Bu ilaç normal depolama şartları altında, açılmamış orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde fiziksel ve kimyasal vasıflarını asgari 2 yıl korur.

İlaç ve ambalaj imhası

Kalan fazla ilaç, tarım ilaçları için ayrılan yerde veya su kaynaklarından uzak yerde imha edilir. Ambalajları iyice boşaltınız, kesiniz ve usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka bir gaye ile kullanmayınız.

Kullanıcının dikkatine

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114

İmalatçı : Syngenta Crop Protection AG, Basle, İsviçre

Üretim Yeri : Route de L'île au Bois, Monthey, İsviçre

İthalatçı : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kazım Dirik Mah. 364 Sk. No.11

Bornova, İZMİR

Telefon : (0232) 413 00 55

®=Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır.

SYNGENTA TARIM
Dr. Ahmet ERGÜÇ
Ankara Bitki Koruma
Bilinç Mitifiçisi
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

17 Eylül 2009

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ