

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No. :
Fiyat tasdik tarih ve no :

Polytrin 200 EC, bir çok zararlının mücadelesinde kullanılan temas ve mide yoluyla etkili sentetik piretroid terkipli bir böcek ilacıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre (gün)
Elma	Elma iç kurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	25 ml / 100 l su	7
	Yaprak bükkenler (<i>Archips spp</i>)	25 ml / 100 l su (larva)	
Bağ*	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	25 ml / 100 l su (larva)	7
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	20 ml / 100 l su	7
Sebze	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	40 ml / da (nimf,ergin)	7
	Yeşilkurt (<i>Heliothis armigera</i>)	30 ml / da	
	Kapsül kurdu (<i>Etiella zinckenella</i>)	50 ml / da	
Baklagil	Baklagil tohum böcekleri (<i>Bruchus spp</i>)	50 ml / da	7
Hububat	Ekin güvesi (<i>Syringopais temperatella</i>)	40 ml / da (erken devre)	
Ayçiçeği	Yeşilkurt (<i>Heliothis armigera</i>)	50 ml / 100 l su	7
Şeker pancarı	Pancar piresi (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	30 ml / da	7
	Kalkan böcekleri (<i>Cassida spp</i>)	30 ml / da	
	Yaprak kurtları (<i>Spodoptera exiqua</i>)	30 ml / da	
	Yaprak böceği (<i>Piesma maculata</i>)	30 ml / da	

* Kırmızı örümcek popülasyonunu artırdığından Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.


İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alan veya ağaç düzğünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın uygulamaya hazırlanması : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptaki su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

KULLANIM ŞEKLİ : Temas ve mide yolu ile etkili olduğundan ilaçlama yaparken iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bunun için aletin kalibrasyon ayarı iyi yapılmalıdır. Pülverizatör ile 40 l / da, atomizör ile 10 l / da su kullanılmaktadır. İlaçlama, günün serin saatlerinde ve rüzgarsız bir havada yapılmalıdır. Traktörle yapılan ilaçlamalarda yaprak altı memesi takılmalıdır. Tekrarlı ilaçlama aralığı 15 gündür. İyi bir netice almak için ilaç tavsiye edilen dozlarda uygulanmalıdır. Altı saat içinde yağış beklenen hallerde ilaçlama ertelenmelidir. İlaçlamalar zararlı yumurtalarının açılmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU : Polytrin 200 EC alkali reaksiyonlu olmayan insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve bekletilmeden kullanılmalıdır. Bakırli ilaçlarla birlikte karıştırılarak kullanılmaz.



TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

16 Ekim 2008

syngenta

Polytrin® 200 EC

syngenta

İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)

Litrede 200 g cypermethrin=(R-S)-alphacyano-3-phenoxybenzyl-(1R, 1S)-cis/trans-3(2,2-dichlorovinyl)-dimethyl-cyclopropanecarboxylate

LD₅₀ cypermethrin: 250 mg / kg

ZEHİRLİ

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK VE SİPERLİK KULLANINIZ.

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ.
SİĞARA İÇMEYİNİZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : İlacın yutulması halinde vücut hareketlerinde dengesizlik, titreme gibi sinirsel belirtiler görülür. Fazla miktarda ilaç deriye bulaşırsa, özellikle yüz kısmında olmak üzere deride uyuşma, yanma ve hissizlik gibi tipik geçici deri hassasiyet belirtileri ortaya çıkabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Zehirlenme veya rahatsızlanma halinde derhal işi bırakınız veya hastayı ilaçlanmış sahadan derhal uzaklaştırınız, kapalı alanda ise derhal açık havaya çıkarınız. İlaçla temas etmiş bulaşık tulum, elbiseler çıkarılmalı, vücudun ilaçla temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göze temas halinde, göz kapakları açılarak gayet yavaş akan su ile gözler 15 dakika süre ile yıkanmalıdır. İlaç solunmuşsa hasta temiz havaya çıkartılmalı, nefes alamıyorsa suni solunum yaptırılmalıdır. İlaç yutulmuşsa hastayı kusturmayınız. Baygın hastaya hiç bir şey verilmez. Gerekliğinde hastayı ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Gerektiğinde ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİ ARAYINIZ UZEM : 114



Net miktarı :
Brüt miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :
Ruhsat tarih/no. : 19.09.1986 / 1946

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz çeşme yakaları ve akar sulara dökmeyiniz. Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız. Faydalı böceklerle, balırlarına çok zehirlidir. Çiçeklenme devresinde kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

İlacı ambalajında kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı kilitli, iyi havalandırılan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz. -5°C'nin altında, +35°C'nin üzerinde depolamayınız. Normal şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajlarında fiziksel ve kimyevi vasıflarını asgari 2 sene muhafaza eder.

YANICIDIRI

FİRMA BEYANI : Kullanıcı imalatçının dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasıyla doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

Syngenta Tarım Sanayi ve Tic.A.Ş.
Kazım Dirik Mahallesi, 364 Sokak
No: 11 Bornova / İZMİR
Tel : (232) 435 80 54

© Syngenta şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dr. Ahmet ERCİS
Bilgi, Koruma
Büro Müdürü