

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj no. :
Ruhsat tarih ve no.: 28.04.1973 / 876

Kullanıldığı Bitkiler ve Kontrol Ettiği Zararlılar

Bitki adı	Zararlı adı	Kullanma dozu
Turuncgöl	Pas böcüsü (<i>Phyllocoptrata oleivora</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Yıldız koşnili (<i>Ceroplastes floridensis</i>)	1250 ml/ 100 l su
	Beyaz sinek (<i>Dialeurodes citri</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Kırmızı örümcek (<i>Panonychus citri</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Sarı kabuklu bit (<i>Aonidiella citrina</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Kırmızı kabuklu bit (<i>Aonidiella aurantii</i>)	1500 ml/ 100 l su
Meyve	Unlu bit (<i>Planococcus citri</i>)	1250 ml/ 100 l su
	Yumuşak koşnil (<i>Coccus pseudomagnoliarum</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Virgül kabuklu biti (<i>Lepidosaphes ulmi</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Armut kabuklu biti (<i>Epidiaspis leperii</i>)	1000 ml/ 100 l su
	Armut psillası (<i>Psylla pyri</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Dut kabuklu biti (<i>Pseudolacaspis pentagona</i>)	1000 ml/ 100 l su
Zeytin	Şeftali virgül kabuklu biti (<i>Coccomytilus halli</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Kara koşnil (<i>Saissetia oleae</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Zeytin koşnili (<i>Parlatoria oleae</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Pamuklu koşnil (<i>Philippia oleae</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Yara koşnili (<i>Pollinia pollini</i>)	1500 ml/ 100 l su
	Unlu bit (<i>Planococcus citri</i>)	1000 ml/ 100 l su
Bağ	Çay koşnili (<i>Pulvinaria floccifera</i>)	1500 ml/ 100 l su

Kullanırken dikkat edilecek hususlar: Kükürtlü ilaçlarla bir arada veya kükürtlü ilaçların tatbikinden 3 hafta sonrasına kadar ilaçlama yapılmamalıdır. Porkan tatbikinden 2 ay sonrasına ve 2 ay öncesine kadar olan süre içinde Captan ve Folpet' li ilaçlar kullanılmamalıdır. Yüksek sıcaklıkta (32° C' nin üzerinde) ve çok düşük sıcaklıkta (4° C' nin altında) ilaçlama yapılamaz. Isı kontrolü gölgede yapılmalıdır. Ağaçlar solgun iken önce sulama yapılmalı, daha sonra ilaç atılmalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve bir kaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır. Basınçlı pülverizatörlerle tatbik edilmelidir.

Karışılabilirlik durumu

Kükürt, Captan, Folpet' li ve Carbaryl' li ilaçlar ile örneğin, Thiovit, Biallor C, Bialor S gibi, karışmaz. Bunun dışındaki ilaçlar ile karışım konusunda çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir.

syngenta
Porkan®
syngenta

İNSEKTİSİT-AKARİSİT
(Böcek - Kırmızı Örümcek ilacı)
Yazlık Yağ Emülsiyonu

Etkili Madde:
700 g / l Mineral Yağ

DİKKAT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE SİPERLİK KULLANINIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ
SİGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLAMADAN SONRA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN
İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Zehirlenme belirtileri

İlaça özel bir belirtisi yoktur.

İlk yardım tedbirleri

Rahatsızlanma halinde bulaşık elbiselerini çıkarınız, ilacın temas ettiği yerleri sabun ve deterjanla yıkayınız. Göze kaçmışsa göz kapağını açık tutarak 15 dakika bol su ile iyice çalkalayınız. **Yutulmuşsa hastayı kusturmaya çalışmayınız.** Acil durumda hastayı, ilaç etiketi ile birlikte derhal doktora götürünüz.

ANTİDOTU

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

19 Kasım 2007

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Azami per. satış fiyatı :
T.K.B. Yazısının Tarih ve No'su :

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER :

İlacı, orjinal ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz. + 35 °C nin üzerinde ve -5 °C nin altında depolamayınız. İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orjinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) : 114

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇISI:

Syngenta Tarım Sanayi ve Tic.A.Ş.
Kazım Dirik Mahallesi, 364 Sokak No: 11
Bornova / İZMİR Tel : (232) 435 80 54

® Syngenta şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dr. Ahmet ERCİŞ
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü

(Handwritten signature)