

İmal tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Şarj no :  
Fiyat Tasdik Tarih ve No :

QUADRIS, geniş spektrumlu sistemik bir fungisittir. Doğal fungal metabolitler olan strobilurin ve oudemansinlerin sentetik analogudur. Spor çimlenmesini ve misel gelişmesini önler.

#### KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR :

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre (gün)
Bağ	Bağ Mildiyözü ( <i>Plasmopara viticola</i> )	75 ml /100 l su	21
	Külleme ( <i>Uncinula necator</i> )	75 ml /100 l su	21
	Ölü Kol ( <i>Phomopsis viticola</i> )	75 ml /100 l su	21
Kabakgiller	Yalancı mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	60 ml /100 l su	3
	Külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	75 ml /100 l su	3
Domates (Tarla)	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	75 ml /100 l su	3
	Erken Yaprak Yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	75 ml /100 l su	3
Karpuz	Erken Yaprak Yanıklığı ( <i>Alternaria cucumerina</i> )	75 ml/da	3
Biber(Sera)	Külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	75 ml/100 l su	3
Çeltik	Çeltik yanıklığı ( <i>Pyricularia oryzae</i> )	100 ml / da	28

#### İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

**İlaçlama aletinin kalibrasyonu :** İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçı su miktarını belirlemek için,önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçı su miktarı hesaplanır. Bitkinin fenolojisine uygun olarak bir dekara kullanılacak su miktarı 40-100 litredir.

**İlacın hazırlanması ve uygulama tekniği :** Önce aletin deposunu yarısına kadar su ile doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın. Sonra, gerekli miktar ilacı depoya ilave edin ve karıştırmaya devam ederek su seviyesini tamamlayın. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

#### KULLANIM ŞEKLİ :

**Bağda Mildiyö:** Sürgün uzunluklarının 25-30 cm boya ulaştığı devrede ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla, günlük ortalama sıcaklıklar 30°C oluncaya kadar devam edilmelidir.

**Bağda Külleme:** 1. ilaçlama henüz sürgünler 25-30 cm uzunluğundayken, 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları döküldüğünde , 3. ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu dikkate alınarak yapılmalıdır. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilmelidir.

**Bağda Ölükol :** 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlama 8-10 cm, 3. ilaçlama ise 25-30 cm boyda iken yapılmalıdır. Bağda bir sezon içinde QUADRIS ile ilaçlama sayısı 4'ü geçmemeli, 3'ten fazla üst üste kullanılmamalıdır.

**Kabakgillerde Yalancı Mildiyö ve Külleme :** Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

**Domateste ( açıkta yetiştirilen) mildiyö ve erken yaprak yanıklığı :** Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı, 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

**Karpuzda erken yaprak yanıklığı :** Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

**Biberde (Sera) külleme :** Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

**Çeltikte çeltik yanıklığı :** Hastalık tarlada görülmeye başladığı zaman ilk ilaçlama, 10 gün ara ile ikinci, gerekirse üçüncü ilaçlama yapılır.

Sebzelerde bir sezon içinde QUADRIS ile yapılacak ilaçlama sayısı 4'ten fazla olmamalı; 2'den fazla üst üste kullanılmamalıdır.

**Bitki tahammülü :** Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, QUADRIS ilacının, tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur.

**KARIŞILIRLIK DURUMU :** QUADRIS'in domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Pirimiphos methyl, Hexaconazole, Pirimicarb, Lambda-cyhalothrin ve Chlorothalonil ile karıştırılabilir.

# syngenta QUADRIS®

FUNGİSİT (Mantar İlacı)  
Süspansiyon Konsantré  
Litrede 250 g Azoxystrobin  
( methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate )

Şıçanlarda akut oral LD<sub>50</sub> = 5000 mg/kg

## DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ  
EVDE KULLANMAYINIZ  
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ  
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ  
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ  
SİGARA İÇMEYİNİZ  
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ  
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ


TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ** Önemli miktarda bünyeye alınmasını takiben mide bulantısı, kusma ve karın ağrısıyla birlikte ishal görülebilir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ :** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya has tayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç ile temas halinde, yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakın. İlaç göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak, gözünüzü suyla 10-15 dakika süreyle yıkayınız. Eğer yutulmuş ise hastayı kusturmayınız. Hastayı, ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mideyi, mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına dikkat ederek yıkayınız. Mangal kömürü ve bir mûşhil ilacı veriniz Sonra semptomatik tedavi uygulayınız.

Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezini arayınız : **UZEM : 114**



Net ve Brüt Ağırlığı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :  
Ruhsat Tarih ve No. : 29.12.1997 /  
3307 (97-234)

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara zararsızdır. Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilaçla kirlertmeyiniz. Evcil hayvanları ilaçlanmış sahadan uzak tutunuz. Yem ve gıda maddelerini ilaçla kirlertmeyiniz. İlaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız. Sulandırılmamış QUADRIS gözlerinizi ve derinizi tahriş edebilir. Temas halinde gözünüzü ve derinizi hemen yıkayınız. İlaç elbisenize dökülmüş ise hemen değiştirip, yıkayınız. Boş ambalajları imha ediniz başka bir gaye ile kullanmayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU :

İlacı serin ve kuru yerde, ağız sıkıca kapalı orijinal ambalajında iyi havalandırılan yerde yem ve gıda maddelerinden uzakta çocukların erişemeyeceği bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlacı -10°C'nin altında ve +35°C'nin üzerinde depolamayınız. İlaç normal depolama şartları altında açılmamış orijinal ambalajında fiziksel ve kimyasal özelliklerini asgari 2 yıl muhafaza eder.

#### FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

#### İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG, Basle, İsviçre  
İTHALATÇI :  
Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Kazım Dirik Mah. 364 Sk. No.11  
Bornova, İZMİR Tel : (0232) 435 80 54

©=Syngenta Şirketler Topluluğunun tescilli ticari markasıdır

Dr. Ahmet ERÇİS  
ANKARA EĞİTİM KURUMU  
BÜRO MÜDÜRÜ  
SYNGENTA TARIM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dr. Ahmet ERÇİS