İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'SU :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu ve dönemi
Ayçiçeği :		
	Yabani Hardal *(Sinapis arvensis)*	300 ml/da
	Yabani Turp*(Raphanus raphanistrum)*	ekimden hemen
	Sirken *(Chenopodium album)*	sonra
	Ballıbaba *(Lamium purpureum)*	
	Çoban Değneği (*Polygonum aviculare*)	
	Yabani Fiğ (*Vicia spp.*)	
	Köpek Üzümü (*Solanum nigrum*)	
	Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu(*Amaranthus retroflexus*)	
	Kuş Otu (*Stellaria media*)	
	Fare Kulağı (*Anagallis arvensis*)	
	Sarmaşık Çoban Değneği(*Polygonum colvolvulus*)	
Havuç:		
	Horoz İbiği (*Amarantus spp*)	250 ml/da
	Semiz Otu (*Portuloca olaracea*)	(Ekimden hemen sonra
	Çoban Değneği (*Polygonum aviculare*)	Havuç toprak yüzüne
	Köpek Üzümü (*Solanum nigrum*)	Çıkmadan önce)
	Yabani Hardal *(Sinapis arvensis)*	
	Yabani Turp*(Raphanus raphanistrum)*	
	Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu(*Amaranthus retroflexus*)	
	Sirken *(Chenopodium album)*	
Patates:		
	Yabani Hardal *(Sinapis arvensis)*	200-250 ml/da
	Gelincik(*Papaver rhoeas*)	Dikimden sonra en geç 5 gün içinde
	Semiz Otu (*Portulaca olaracea*)	(hafif topaklarda
	Sirken *(Chenopodium album)*	düşük, ağır topraklarda
	Şahtere (*Fumaria officinalis*)	yüksek doz kullanılır)
	Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu(*Amaranthus retroflexus*)	
	Yeşil Horozibiği(*Amarantus viridis L*)	
	Çoban Çantası (*Capsella-bursa-pastoris*)	
	Köpek Üzümü (*Solanum nigrum*)	

KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI: Racer 25 EC, ayçiçeği ve havuçta ekimden hemen sonra (1-2 gün içersinde), patateste dikimden sonra en geç 5 gün içersinde toprak yüzeyine uygulanmalıdır. Racer'den en yüksek etkiyi almak için, ekimden veya dikimden önce toprak kesekniz olarak hazırlanmalıdır. Racer çıkmış yabancıotlara etkili olmadığından uygulama sırasında tarlada çıkmış yabancı ot bulunmamalıdır. Racer uygulandıktan sonra ilaçlı tabakanın bozulmaması için, zorunlu olmadıkça toprak işlenmemelidir. Patateste geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi olarak, hafif topraklarda düşük(200ml/da), ağır topraklarda yüksek doz (250ml/da) kullanılmalıdır. İlaçlama yelpaze şeklinde püskürtme yapan (tee-jet) meme ile 2.0-2.5 bar basınçla yapılmalıdır. İlaçlama rüzgârsız havada yapılır. İlaçlama yaparken aynı yerden üst üste geçilmemelidir. Havuç tohumlarının çimlenmesi için sulama gerekli ise, Uygulamadan sonra hemen yağmurlama sulama yapılmalıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposuna yarı miktarda temiz su konur. Tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak depoya atılır. Karıştırıcı çalışırken kalan su depoya ilave edilir. Tavsiye edilen dozun birim alana atılabilmesi için, önce ilaçlama aletinin kalibrasyonu yapılır. Bunun için aletin deposuna bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Bu kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanır. Dekara 20-25 litre su kullanılması tavsiye edilir.

KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU : Ayçiçeğinde Acetochlor aktif maddeli ilaçlarla tank karışımı yapılarak pre-emergence olarak kullanılabilir.

RACER 25 EC

Herbisit (yabancı ot ilacı)
Emülsiyon konsantre

Sıçan akut oral LD_{50} 3650 mg/kg.

Litrede 250 gr saf Flurochloridone içerir

3-chloro-4-(chloromethyl)-1-3[trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidone

DİKKAT

- **KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.**
- **EVDE KULLANMAYINIZ.**
- **ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.**
- **İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİ TENEFÜS ETMEYİNİZ.**
- **MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.**
- **İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ.**
- **SİGARA İÇMEYİNİZ.**
- **DERİ VE GÖZ TEMESINDAN KAÇININIZ.**
- **İLAÇLANMIŞ SAHAYA BİR GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler başlangıçta mide bulantısı kusma, karın ağrısı ve ishaldir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Eğer göze gelmiş ise, göz kapaklarını açarak gayet yavaş akan su ile 10-15 dakika süre yıkayınız. Doktora gidiniz. EĞER İlaç YUTULMUŞ ise hastayı kusturmayınız. Ambalaj ve etiket ile birlikte hastayı derhal doktora götürünüz.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur.

TEDAVİ ŞEKLİ: Mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına özen göstererek mideyi yıkayınız. Sonra simptomatik tedavi uygulayınız.

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ANKARA (0800) 314 79 00

KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NET MİKTARI : 1.0lt
BÜRÜT AĞIRLIĞI : 1.100 kg
AZAMİ PARAKENDE SATIŞ FİYATI :
T.B.YAZISI TARİH VE NOSU :

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- İlaçlama esnasında genel korunma tedbirlerine mutlaka uyunuz.
- Bu ilacı kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz.
- Göz koruyucu (en azından gözlük) kullanın. Sulandırılmamış Racer gözlerinize zarar verebilir, gözünüze geldiğinde onu hemen yıkayınız, ilk yardıma bakınız.
- Sulandırılmamış Racer derinizi tahriş edebilir. Eğer derinize bulaşmış ise hemen yıkayınız.
- Elbisenize dökülmüş ise değiştirip hemen yıkayınız.
- İlacı ambalajında kapalı olarak çocukların ulaşamayacağı kilit altında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz, başka amaçlar için kullanmayınız.
- Kalan ilaç atıklarını sulara bulaştırmayınız.
- Yalnızca tavsiye edilen amaçlarda ve dozlarda kullanılmalıdır.
- **Soğan, Domates, Tütün, Kabakgiller** (Kabak, Hıyar, Karpuz ve Kavun) ve **Lahanagiller** (Lahana, Karnabahar ve Turp) **ilaca karşın çok hassas olduklarından RACER 25 EC kullanılan tarlaya 12 ay sonra ekilmelidir.**

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER:

İlaç kapalı kendi ambalajında, normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. 10 °C'nin altında ve 32 °C'nin üstünde saklamayın. İlacı dondan koruyunuz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı ilacın kalitesini garanti eder. İlacın tavsiye dışı ve yanlış kullanımı veya hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan ilacın üreticisi sorumlu tutulamaz.

İMALATCISI:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.

RUHSAT SAHİBİ:
FLOGAZ FLORLU GAZLAR SAN.VE TİC. A.Ş.
YAPI KREDİ PLAZA C BLOK KAT:18
LEVENT/İSTANBUL

FLOGAZ
FLORLU GAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ