

30.08.2009

SYNGENTA TARIM SANAYI VE TICARET A.Ş.

[Handwritten signature]

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj no :
Fiyat tasdik tarih ve no :

REVUS 250 SC, mandelamide sınıfında yer alan ve mandipropamid aktif maddesini içeren yeni bir fungisitir. Mandipropamid, mildiyö gibi önemli ekonomik kayıplara neden olan oomycetes grubu funguslara karşı etkilidir. Spor çimlenmesi üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğu gibi miselyal gelişimi ve sporulasyonu da etkiler. Yaprak dokusuna girişinden sonra mükemmel bir translamınar etkiye sahiptir. Ayrıca inkubasyon periyodunda miselyal gelişmeyi önleyecek tedavi edici özellik de gösterir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki adı	Hastalık adı	Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
Hıyar (Sera)	Yalancı Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)	80 ml / 100 l su	3
Domates (Sera)	Mildiyö (Phytophthora infestans)	80 ml / 100 l su	3

İLAÇIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılmalı, harcanan su miktarı belirtenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanmalıdır.

İlaçın uygulamaya hazırlanma şekli :

Önce aletin deposu yarısına kadar suyla doldurulmalı ve tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kaptan önce karıştırıldıktan sonra bu ön karışım ilaçlama tankına ilave edilmelidir. Sonra, ilaçlama tankı ağız hizasına kadar suyla doldurulmalı ve ilaçlamaya geçilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ :

Hıyarda yalancı mildiyö : İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde başlanır. İlaçlamalar, hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla tekrarlanır.

Domateste mildiyö : Sera veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülmeye başladığında ilaçlamaya başlanır ve hastalığın seyrine göre 7-10 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir.

Bitki tahammülü : Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, ilacın tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

KARIŞILIRLIK DURUMU :

Uygulamalardan önce karışıma giren ilaçların fiziksel karışılabilirlik testleri yapılmalıdır. Hıyarda insektisit ve akarisitlerle karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.

13 Temmuz 2010

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Duran KOÇA
Genel Müdür

syngenta

REVUS 250 SC

FUNGİSİT (Mantar İlaç)
Süspansiyon Konsantre (SC)

Litrede 260 g Mandipropamid : (RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-nyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-nyloxy)acetamide

Sıçanlarda akut oral LD₅₀ : > 5 000 mg/kg

DİKKAT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFÜS ETMEYİNİZ
MASKE, KORUYUCU EYİŞİ, EL DİVEN, SİPERLİK VE GÖZLÜK KULLANINIZ
İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLANAN SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç ile temas halinde, yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız. İlaçla fazla temas etmeyiniz. Cilde teması halinde, ilaçla bulaşık giysileri çıkarınız. İlaç değen kısımları sabunlu su ile iyice yıkayınız. İlaç göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak, gözünüzü suyla 10-15 dakika süreyle yıkayınız. Eğer yutulmuş ise hastayı kusturmayınız. Hastayı, ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz. Baygın hastaya kesinlikle ağızdan birşey vermeyiniz. Aşırı solunması halinde hastayı temiz havaya çıkarınız. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yaptırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

Gerektiğinde Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız : UZEM : 114



Net ve Brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Ruhsat tarih ve no : 25.08.2009/ 7134

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Suda yaşayan canlılara zehirlidir. Sulama ve dahili işlerde kullanılan sulama, akar ve durgun su sahalarını, drenaj sistemlerini ilaç atıklarıyla veya ilacın hedef dışına sürülmesi ile kirletmeyiniz. Tüm evcil hayvanları ilaçlanacak sahadan uzak tutunuz. Gıda ve yem maddelerini ilaç ile kirletmeyiniz. Kalan fazla ilaç, tarım ilaçları için ayrılan yerde veya su kaynaklarından uzak yerde imha edilir. Ambalajları iyice boşaltınız, kesiniz ve usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka bir gaye ile kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

İlaç serin ve kuru yerde, kilit altında, orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak yerlerde, normal depolama şartlarında muhafaza ediniz. +35°C'nin üzerinde ve -10°C'nin altında depolamayınız. Bu ilaç normal depolama şartları altında, açılmamış orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl korur.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG, Basle, İsviçre
ÜRETİM YERİ :
Route de L'ile au Bois, Monthey, İsviçre
İTHALATÇI :
Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kazım Dink Mah. 364 Sk. No.11
Bornova, İZMİR
Telefon : (0232) 413 00 55

®=Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır.