

İmal tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Şarj no :  
Ruhsat tarihi ve no. : 04.10.2006 -- 5658

Ridomil Gold MZ 68 WG; kabakgiller (hıyar), patates, domates, soğan ve bağda mildiyö hastalıklarının mücadelesinde hastalık çıkışından önce önleyici olarak kullanılan residuel ve sistemik etkili bir fungisittir. Sistemik etkili olan metalaxyl-m 30 dakika gibi kısa bir sürede yeşil aksam tarafından alınır ve bitki özünün nakil ile yukarı taşınarak yapraklara dağılır. Böylece fungal gelişimi ve çoğalmayı önleyerek bitkiyi, ilaç tatbikatından sonra meydana gelen yeni aksam da dahil olmak üzere, mantarlara karşı dahilen korur. Mancozeb, koruyucu bir fungusit olup, bitki dokuları üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve mantar sporlarının gelişimini önler.

#### Kullanıldığı Bitkiler, Hastalıklar ve Dozları

Kültür Bitkisi	Hastalık	Dozu 100 l suya veya dekara	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (gün)
Kabakgiller (Hıyar)	Yalancı mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	250 g	10
Patates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250 g	14
Domates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250 g	10
Soğan	Mildiyö ( <i>Peronospora destructor</i> )	250 g	10
Bağ	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	250 g	14

**Bitki tahammülü:** Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, Ridomil Gold 68 WG 'nin tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur.

**Uygulama Zamanı :** Tavsiye edildiği ürünlerde ilaçlamaya, hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce), bağda ise erken gelişme döneminde başlanır. 10-14 gün aralıklarla azami üç uygulama yapılır. Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungusit kullanılması tavsiye edilir.

#### Uygulama tekniği

Yeşil aksamın ilaçla iyi bir şekilde kaplanması için yeterli su kullanılmalı, ancak ilaçlı mahlülün yapraklardan yıkanmasına meydan verilmemelidir. 100 litre suya verilen dozlardaki ilaçlama hacmi uygundur. Şayet daha az su kullanılacak ise ilaçlı mahlülünün konsantrasyonu buna göre artırılır.

**İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu :** İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaç su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzğünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek kullanılacak ilaç su miktarı hesaplanır.

#### İlacın uygulamaya hazırlanması

Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta ön karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

#### Karşıabilirlik durumu

Belirtilen mahsüllerde kullanılan fungusit, insektisit, akarisit ve bitki besin preparatlarının çoğu ile karşıabilir. Tereddüt halinde fiziksel karşıabilirlik testi yapılmalıdır.

# syngenta

## Ridomil® Gold MZ 68 WG

syngenta

FUNGİSİT (Mantar İlacı)

İslanabilir granül (WG)

% 64 mancozeb

- Çinko tuzu ve polymeric manganese ethylene bis dithiocarbamate kompleksi

% 4 metalaxyl-M

- N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxyacetyl)-D-alanine methyl ester ihtiva eder.

LD<sub>50</sub> : 667 mg/kg

### DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ

İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİRŞEY YEMEYİNİZ,

SİGARA İÇMEYİNİZ

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ

İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNŞAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİNİN İNŞANDA KULLANILMASI**

**KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

#### Kullanıcının emniyeti

Yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce elinizi ve yüzünüzü yıkayınız.

İş bittikten sonra elbiselerinizi değiştirin ve tüm vücudunuzu yıkayın.

Tekrar kullanmadan önce iş elbiselerini yıkayın. Eğer bir rahatsızlık hissedilir ise hemen işi bırakın ve doktor çağırın.

**Zehirlenme belirtileri**

İnsanlarda zehirlenme vakası görülmemiştir.

#### İlk Yardım Tedbirleri

Rahatsızlık hissedilir ise işi bırakın. İlaçla daha fazla temas etmeyin.

Tüm iş elbiselerinizi çıkarın. Hastayı sabunlu su ile iyice yıkayın.

Gözleri temiz, bol su ile asgari 15 dakika çalkalayın. Şayet ilaç yutulmuş ise bol su ile, bol miktarda tıbbi kömür veriniz. Baygın hastaya kesinlikle ağızdan birşey verilmez.

Brüt ağırlığı :

Azami perakende satış fiyatı :

Tarım ve Köyişleri

Bakanlığı yazısının tarih/no.su :

#### Çevre ve yaban hayatı

Arılara ve balıklara zehirlidir. Sulama ve dahili işlerde kullanılan suları, akar ve durgun su sahalarını, drenaj sistemlerini ilaç atıklarıyla veya ilacın hedef dışına sürüklenmesi ile kirlitemeyiniz.

Tüm evcil hayvanları ilaçlanacak sahadan uzak tutunuz. Gıda ve yem maddelerini ilaç ile kirlitemeyiniz.

#### Depolama

İlacı serin ve kuru yerde, kilit altında, orijinal ambalajında, ağız sıkıca kapalı olarak çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak yerlerde, normal depolama şartlarında muhafaza ediniz. +35° C'nin üzerinde depolamayınız. Bu ilaç normal depolama şartları altında, açılmamış orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde fiziksel ve kimyasal vasıflarını asgari 2 yıl korur.

#### İlaç ve ambalaj imhası

Kalan fazla ilaç, tarım ilaçları için ayrılan yerde veya su kaynaklarından uzak yerde gömülerek imha edilir. Ambalajları iyice boşaltınız ve tarım ilaçları için ayrılan yerde veya emin bir yerde yakarak imha ediniz. Başka bir gaye ile kullanmayınız.

#### Kullanıcının dikkatine

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

#### ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ

Ankara (0800) 314 79 00

**İmalatçı :** Syngenta Crop Protection AG, Basle, İsviçre

**İthalatçı :** Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kazım Dirik Mah. 364 Sk. No.11

Bornova, İZMİR

Telefon : (0232) 435 80 54

®=Syngenta Şirketler Topluluğunun tescilli ticari markasıdır.

Dr. Ahmet ERCİSİ  
Ankara Biki Koruma  
Büro Müdürü  
SYNGENTA TARIM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Dr. Ahmet Arslan  
Genel Müdür Yardımcısı

TARIM VE KÖYİŞLERİ  
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

04 Ekim 2006