

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi:
Şarj no :
Ruhsat tarih/no : 17.12.1993 / 2683
İlacın özellikleri

SCORE 250 firmamız tarafından keşfedilen ve geliştirilen, yeşil aksama tatbik edilen sistemik triazol yeni bir fungisitir.
SCORE 250 elma ve armutta Karaleke-*Venturia spp.* mücadelesinde hem meyve hem de yapraklarda üstün koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip bir ilaçtır.
SCORE 250 lokal sistemik ve güçlü translaminer etkiye sahiptir.İlaçlamadan sonra 2 saat gibi kısa bir sürede atıldığı yerden süratle bitki bünyesine dahil olur, yaprağın her tarafına dağılır.
SCORE 250 Karaleke hastalığını meydana getiren mantarın gelişmesini daha erken devrede önlediğinden hastalık çıkışına meydan vermez.
Score 250 EC Şeker pancarında *Cercospora* yaprak leke hastalığı ve külleme mücadelesinde de üstün kontrol sağlar.
Tavsiyeler

Karaleke mücadelesinde, hastalık belirtileri görülmeden önce, koruyucu ilaçlamalar şeklinde tavsiye edilir.

Mahsul	Kontrol ettiği hastalık	Tavsiye dozu	İlaçlama programı	Bekleme süresi
Elma	Elma karalekesi- <i>Venturia inaequalis</i>	10 ml/100 lt su	1. İlaçlama: Tomurcukların kabardığı devre 2. İlaçlama: Pembe tomurcuk devresi 3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının %70-80'i döküldüğünde 4. ve diğer ilaçlamalar: iklim şartlarına göre gerektiğinde 10-14 gün ara ile	14 gün
Armut	Armut karalekesi- <i>Venturia pyri</i>			
Şekerpancarı	Yaprak leke hastalığı- <i>Cercospora beticola</i>	30 ml/dekar		
Şekerpancarı	Külleme- <i>Erysiphe betae</i>	20 ml/dekar		

Uygulama metodu

İlaçlama, meyvede tazyikli motorlu pülvizatörlerle ağaçların her tarafı ilaçlı mahlül ile temas edecek şekilde yapılmalı, ancak ilacın yapraklardan yükanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir.

İlacın hazırlanması

Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz ve karıştırıcısını çalıştırınız. Tavsiye edilen miktarda ilacı karıştırıcı çalışır vaziyette iken deposuna ilave ediniz, sonra su seviyesini tamamlayınız. İlaçlama esnasında da karıştırıcı çalışır durumda olmalıdır.

Diğer ilaçlar ile karışma durumu

SCORE 250 kendinden önce uygulanan veya tank karışımı olarak kullanıldığı ilaçlardan etkilenmez. İhtiyaç halinde diğer ilaçlar ile fiziksel karışabilirlik durumu söz konusu ilaca az miktarda SCORE 250 ilave edilme suretiyle kontrol edilebilir.

Bitki tahammülü

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında SCORE 250 tavsiye edildiği bitkiler tarafından iyi tolere edilir.

Score® 250 EC

syngenta

FUNGİSİT (Mantar ilacı)

Emülsiyon

Litrede 250 gram difenoconazole \pm 1- $\{$ 2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-chlorophenyl-(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-methyl]-1H-1,2,4-triazole

LD₅₀ difenoconazole: 1453 mg/kg.

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.

İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ.

SİGARA İÇMEYİNİZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

Kullanıcının Emniyeti

Yemen, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakın, ilk yardım tedbirlerini alın. İş bittikten sonra koruyucu ekipmanı iyice temizleyin, vücudun ilaca maruz kalan kısımlarını yıkayın sonra günlük elbiselerinizi giyin.

Zehirlenme belirtileri

İnsanlarda zehirlenme belirtisi görülmemiştir.

İlk yardım

Muhtemel olmamakla beraber zehirlenmeden şüpheleniliyor ise işi bırakın ve doktor çağırın.

Hastanın ilaça daha fazla temasını kesin.

Elbiseleri çıkarıp, hastayı sabunlu su ile iyice yıkayınız. Hastayı iyi havalandırılan bir yere alınız.

Şayet ilaç yutulmuş ise bolca aktif kömür veriniz.

ANTİDOTU

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



05 TEM 2001

Net miktarı :
Brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı:
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
yazısının tarih/no.su:

Çevre ve yaban hayatı
Balıklara zehirlidir. Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı, buradan yem ve gıda maddesi toplanmamalıdır.
İlaç artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilaçla kirlilemeyiniz. Evcil hayvanları ilaçlanacak sahadan uzak tutunuz. Yem ve gıda maddelerini ilaçla kirlilemeyiniz.

Artıkların imhası

Artan ilacı, tarım ilaçları için kabul edilen yerde, su kaynaklarından uzakta gömerek imha ediniz. Fazla ilaçlı mahlül tarım yapılmayan araziye saçılarak imha edilir. Ambalajları iyice boşaltın. Tarım ilaçları için kabul edilen emin bir yerde yakarak imha ediniz. Boş ambalajları başka bir gaye ile kullanmayınız.

Depolama şartları

İlacı güneş ve rutubetten uzakta, orijinal sıkıca kapalı ambalajında iyi havalandırılan yerde yem ve gıda maddelerinden uzakta kilit altında muhafaza ediniz. İlacı - 5°C'nin altında ve + 35°C'nin üzerinde depolamayınız.

Depolama ömrü

Bu ilaç normal depolama şartları altında açılmamış orijinal ambalajında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

Kullanıcının dikkatine

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır.
İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanımasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ

Ankara (0800) 314 79 00

İzmir (0232) 277 73 33

İmalatçısı: Syngenta Crop Protection AG, Basle, Switzerland

İthalatçısı: Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı 48/4 80 700

Esentepe-İstanbul

Telefon : 0 (212) 2 88 44 14

© Syngenta AG, Basle, Switzerland'un tescilli ticari markasıdır

HIKMET ÖZDAR
SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No: 48/4
Esentepe, 80700 İS/ANKARA
Vergi Dairesi: Mecidiyeköy 632041821

15 Mar 2001

TARIM ve KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR EDİLMİŞTİR.

Erkan YILDIRIM
Bakan
Genel Müd.