

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No. :
Fiyat tasdik tarih ve no :

Patates , Domates ve Bağda Mildiyö hastalıklarına karşı kullanılan geniş spektrumlu sistemik bir fungisitir.

Kullanıldığı Bitkiler ve Hastalıklar

Bitki	Hastalıklar	Kullanma dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g / da	21 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g / da	3 gün
Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g / 100 l su	28 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Bunun için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya omca başına kullanılacak ilaç su miktarı hesaplanır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanışı:

Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kaptan önce karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama bittikten sonra ilaçlama aletini iyice yıkayınız.

KULLANIM ŞEKLİ :

Patates ve Domateste mildiyö : Mildiyönün her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden başlanmalıdır. Hastalığın her yıl 1 görüldüğü alanlarda ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir. Havaın sıcak ve kuru geçtiği yerlerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, yağışlı yerlerde ise birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Bağda mildiyö : Tahmin ve uyarı sistemlerinin uygulanmadığı yörelerde mücadeleye hastalık görülmeden önce başlanmalıdır. 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında yapılmalıdır. Hastalık için koşullar uygun olduğu takdirde 2. ve diğer ilaçlamalara devam edilmelidir. Hastalık için uygun koşullar ortadan kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyarı istasyonlarının bulunduğu yörelerde ise ilaçlamalar için yapılacak bilgilendirmeler dikkate alınmalıdır.

Bitki tahammülü

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında ilacın tavsiye edildiği bitkilerde olumsuz herhangi bir etkisi yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Bilinen bir çok ilaçla karışabilir. Ancak uygulayıcı sorumluluğunda bir ön deneme yapılması önerilir.

31 Temmuz 2009

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

syngenta TRIMILTOX® MAX

syngenta
FUNGİSİT (Mantar ilacı) Islanabilir Granül (WG)

Etkili Madde:

% 13.3 (ağ/ağ) Mancozeb
% 30.0 (ağ/ağ) Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür ve bakır sulfat
% 4.0 cymoxanil

Sıçanlarda akut oral LD₅₀ : 700 mg/kg

DİKKAT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE SİPERLİK

KULLANINIZ.

İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ.

SİGARA İÇMEYİNİZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLAMA SAHASINA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Bulantı, mavi-yeşil renkli bazen kanlı kusma, karın ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, baş dönmesi görülebilir. Ciddi durumlarda su kaybı, kansızlık, kan bozukluğu ortaya çıkabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç ile temas halinde, yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız. Hastayı havadar bir yere alınız. İlaç göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak, gözünüzü suyla en az 15 dakika süreyle yıkayınız. Eğer yutulmuş ise hastayı kusturmayınız. Hastayı, ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Geçtiğinde ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİ arayınız. UZEM:114



Net ve brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :
Ruhsat tarih/no. :05.02.2007 / 5837

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Balıklara ve suda yaşayan diğer canlılara zehirlidir. İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız. Boş ilaç ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU :

İlaç orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, güneş görmeyen, kuru, havadar ve serin bir yerde yiyecek ve yemlerden ayrı bir bölüme, kilit altında saklanmalıdır. Rutubet almadığı takdirde ve yıllık ortalama sıcaklığın 25° C' yi geçmediği şartlarda en az 2 yıl fiziksel ve biyolojik özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇISI VE RUHSAT SAHİBİ :

Syngenta Crop Protection AG,

Basle, İsviçre

ÜRETİM YERİ :

Syngenta Agro S.A.S.

F-27600 St- Pierre la Garenne ,

Gaillon, Fransa

İTHALATÇI:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kazım Dirik Mah. 364 Sk. No.11

Bornova, İZMİR

Telefon : (0232) 435 80 54

®= Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır.

SYNGENTA TARIM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İzmir
Ankara
Büro Müdürü