

# ГЕЗАГАРД®

syngenta



**Гезагард 500 FW, к.с.**  
Спеціаліст з соняшнику і овочів



## ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

<b>Склад</b>	Прометрин 500 г/л
<b>Характер дії</b>	Селективний
<b>Культури</b>	Соняшник, картопля, кріп, боби, морква, горох, коріандр, та ін.
<b>Норма внесення</b>	2,0 – 5,0 л/га
<b>Преп. форма</b>	FW – концентрат суспензії
<b>Упаковка</b>	5 л та 0,3 л



## ГЕЗАГАРД 500 FW к.с. МОЖЕ КОНТРОЛЮВАТИ ШИРОКИЙ СПЕКТР БУР'ЯНІВ

Дводольні		Злакові
Курячі очка польові	Фізалис дикий	Пальчатка криваво-червона
Щириця звичайна	Гірчак почечуйний	Просо селянське
Лобода біла	Портулак городній	Просо куряче
Лобода гібридна	Гірчиця польова	Просо волосовидне
Лобода багатонасінна	Паслін чорний	Просо напівквітуче
Роман польовий	Шпергель звичайний	Елевзина індійська
Череда трироздільна	Осот городній	Лептохлоа різноманітна
Гірчиця види	Зірочник середній	Тонконіг однорічний
Грицики звичайні	Кропива жалка	Тонконіг звичайний
Льонок малий	Вероніка персидська	Канарєсчник канарський
Королиця посівна	Нетреба звичайна	
Дурман звичайний	Нетреба колюча	
Дворятник стінний	Переліска однорічна	
Галінсога дрібноквіткова	Буркун лікарський	
Герань розсічна	Ромашка види	
Геліотроп європейський		



## ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

ЛЬОНОК МАЛИЙ

СПОРИШ

РЕДЬКА ДИКА

ФІАЛКА

ГІРЧАК ВУЗЛУВАТИЙ

КРОПИВА ГЛУХА

ВЕРОНІКА  
ПЕРСИДСЬКА

Гезагард 500 FW, к.с. деякі бур'яни краще контролює за обробітку їх у стадії ранніх сходів

Цю особливість слід враховувати, якщо такі бур'яни є домінуючими



## ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Бур'яни	Фаза внесення	
	До сходів	Ранні сходи
Плоскуха звичайна	Чутлива	Помірно чутлива
Просо волосовидне	Чутлива	Стійка
Пажитниця п'янка	Помірно чутлива	Чутлива
Мишії	Стійка	Помірно чутлива
Овсюг, сорго	Стійка	Стійка

Гезагард 500 FW, к.с. – препарат для боротьби з однорічними дводольними. Він може впливати на деякі однорічні злакові, але не може бути задіяний, як протизлаковий гербіцид



## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

<b>Культура</b>	<b>Спосіб, час</b>
<b>Соняшник</b>	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, або до появи сходів культури
<b>Картопля</b>	Обприскування ґрунту до появи сходів культури
<b>Морква</b>	Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів або у фазі 1-2 справжніх листків
<b>Кріп, петрушка, горох овочевий</b>	Обприскування ґрунту до появи сходів культури (протягом 2-5 діб після висівання)
<b>Горох на зерно, соя, часник, боби кормові</b>	Обприскування ґрунту до появи сходів культури
<b>Коріандр</b>	Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або у фазі 2 справжніх листків
<b>Квасоля</b>	Обприскування ґрунту за 2-3 дні до появи сходів



## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

<b>Культура</b>	<b>Норма витрати, кг/га</b>	<b>Максимальна кількість обробок</b>
Соняшник	2,0 – 4,0	1
Картопля, кріп, боби кормові, коріандр	3,0 – 4,0	1
Морква	2,0 – 3,0	1
Петрушка	4,0	1
Горох овочевий	2,0	1
Горох на зерно, соя, часник	3,0 – 5,0	1
Квасоля	3,0	1



## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ (БАКОВІ СУМІШІ)

Культура	Препарат	Норма витрати, л/га
Соняшник, соя, горох, картопля	Дуал Голд 960 ЕС, к.е.	1,3-1,6
	Гезагард 500 FW, к.с.	2,0-3,0



## ШИРШИЙ СПЕКТР, СИЛЬНІША ДІЯ СУМІШІ ДУАЛ ГОЛД 960 ЕС, к.е. + ГЕЗАГАРД 500 FW, к.с.


Дуал Голд 960 ЕС, к.е.	Гезагард 500 FW, к.с.	Синергічна дія
Мишій гігантський	Геліотроп європейський	Елевзина індійська
Мишій зелений	Герань розсічна	Лобода біла
Мишій сизий	Гірчиця види	Пальчатка криваво-червона
Лисохвіст	Дворядник стінний	Паслін чорний
Грицики звичайні	Зірочник середній	Портулак городній
Гумай	Канарєчник канарський	Просо волосовидне
Пальчатка кровоспинна	Королиця посівна	Просо напівквітуче
Плоскуха звичайна	Кропива жалка	Просо селянське
Череда трироздільна	Шпергель звичайний	Ромашка



## ШИРШИЙ СПЕКТР, СИЛЬНІША ДІЯ СУМІШІ ДУАЛ ГОЛД 960 ЕС, к.е. + ГЕЗАГАРД 500 FW, к.с.

Дуал Голд 960 ЕС, к.е.	Гезагард 500 FW, к.с.	Синергічна дія
Сорго дике	Курячі очка польові	Галінсога дрібноквіткова
Щетинник	Лептохлоа різноманітна	Гірчаки види
	Лобода (види)	Дурман звичайний
	Нетреба (види)	Грицики звичайні
	Переліска однорічна	Щириця біла
	Просо куряче	
	Роман польовий	
	Тонконіг (види)	
	Фізаліс дикий	


**Оцінка фітотоксичності ґрунтових гербіцидів та їх сумішей на соняшник  
(% деформації листя)**



# Прояв фітотоксичності на різних стадіях розвитку соняшника



# Оцінка впливу ґрунтових гербіцидів та їх сумішей на висоту рослин соняшника (см)





## ГЕЗАГАРД 500 FW, к.с. У БАКОВІЙ СУМІШІ

- Значно розширює спектр контрольованих бур'янів
- Дозволяє вирішити проблему однорічних дводольних бур'янів, у тому числі хрестоцвітних
- Посилюється ефективність за рахунок синергізму
- Зменшується фітотоксичне навантаження на культуру
- Подовжена (до 10-12 тижнів) захисна дія



## ГЕЗАГАРД 500 FW к.с. У БАКОВІЙ СУМІШІ

ДУАЛ ГОЛД (1,2 Л/ГА) + ГЕЗАГАРД (2 Л/ГА)  
НА ГОРОСІ



ГЕЗАГАРД (2,0) + ДУАЛ ГОЛД (1,6)





## ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Широкий спектр дії проти однорічних злакових та дводольних бур'янів
- Гнучкий у застосуванні, дає можливість вибрати оптимальні строки обприскування
- Застосовується на багатьох культурах
- Оптимальна тривалість захисної дії
- Відноситься до 3-го класу (малотоксичні) класифікації ВООЗ
- Можна змішувати з іншими загальнозживаними гербіцидами на відповідних культурах

*Розкриймо потенціал рослини разом*

**syngenta**

Консультаційний центр компанії "Сингента"  
Тел.: 0-800-500-449