



ЛОГРАН_{75WG}

syngenta

ЛОГРАН 75 WG В.Г.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИ НИЗЬКИХ ВИТРАТАХ



ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

Склад	Триасуальфурон 750 г/кг
Характер дії	Селективний гербіцид, що поглинається листям і корінням
Культури	Пшениця і ячмінь
Норма внесення	6,5-10 г/га
Преп. форма	Водорозчинні гранули
Упаковка	10 x 120 г



МЕХАНІЗМ ДІЇ


- Впливає на процеси фотосинтезу та ділення клітин
- Викликає хлороз та деформацію листків і стебел бур'янів
- Візуальні симптоми проявляються через 7–10 днів
- Повна загибель бур'янів настає через 2-3 тижні






ВІКНО ЗАСТОСУВАННЯ

Кількість обробок – 1
Об'єм води – 250-300 л/га






ШИРОКИЙ СПЕКТР ДІЇ

Високочутливі бур'яни	Чутливі бур'яни	Середньочутливі бур'яни
>90%	<90%	75%
Приворотень польовий Щириця гібридна Щириця звичайна Гусимець Таля Біфора промениста Гірчиця польова Грицики звичайні Кропивка волосиста Кучерявець Софії Гречка татарська Жабрій звичайний Соняшник падалиця Латук татарський Ромашка види Куколиця нічна Незабудка польова Редька дика Сухоребрик лікарський Зірочник середній Талабан польовий	Петрушка собача Амброзія полинолиста Роман польовий Волошка синя Роговик польовий Віниччя справжнє Дзеркало дівоче Хрінниця круповидна Горобейник польовий Калачики види Мак сумнівний Мак дикий Гірчак березковидний Гірчак почечуйний Шпергель звичайний Фіалка триколірна	Щириця жминовидна Королиця посівна Молочай-сонцегляд Рутка лікарська Кропива глуха пурпурова Кропива глуха стеблеобгортна Вероніка двійчаста Підмаренник чіпкий Осот рожевий Осот жовтий



БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ





syngenta



ПАРТНЕР ДЛЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ

Препарати	Норма витрати, г, л/га
Логран 75 WG в.г.+ Банвел 4S 480 SL в.р.к.	7- 10 0,15
Логран 75 WG в.г.+ Пік 75 WG в.г	5- 7 10-15
Логран 75 WG в.г.+ Діален супер 464 SL в.р.к.	7- 10 0,3



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Стадія культури	Від 3 листків до прапорцевого листка включно
Норма внесення	6,5-10 г/га
Стадія бур'янів	Однорічні – 2-4 листки Осоти – розетка Підмаренник – 3-5 кілець
Оптимальна температура	5-25°C



ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Ефективний проти домінуючих однорічних дводольних бур'янів у т.ч. стійких до групи 2,4-Д та 2М-4Х
- Ефективний **при низьких температурах** починаючи з 5°C
- Ґрунтова дія, що особливо важливо **при зріджених посівах**
- Контактна та проникаюча дії
- Застосовується **до прапорцевого листка включно**
- Низька вартість обробки
- **Гарантована прибавка потенційного урожаю**



Розкриймо потенціал рослини разом

syngenta

Консультаційний центр компанії "Сингента"
Тел.: 0-800-500-449