

Oriline I

Insetto *Orius laevigatus*

Fitofagi Tripidi (*Frankliniella occidentalis*)

Colture Orticole e floricole in serra. Particolarmente indicato su peperone



Vantaggi

- *Si insedia molto bene in colture ricche di polline*
- *Alta efficienza grazie alla facilità di insediamento e di diffusione*
- *Azione collaterale su afidi e acari*

Trattamento standard contro i tripidi delle colture orticole ed ornamentali in serra. Il principale bersaglio è *Frankliniella occidentalis*, ma può predare anche afidi ed acari.

Insetto

Oriline I contiene *Orius laevigatus*, un rincote antocoride per il quale tutti gli stadi mobili sono attivi nel controllo del fitofago.

Confezioni

Bottiglia da 250 ml contenente 500 individui (adulti e ninfee).

Bottiglia da 500 ml contenente 1000 individui (ninfee di 1° e 2° stadio).

Bottiglia da 500 ml contenente 2000 individui (adulti e ninfee).

Dosi

Distribuire 0,5-1 individuo per m².

Modo d'uso

Effettuare il lancio durante le ore fresche della mattina o della sera evitando le ore di piena insolazione. Si consiglia un lancio preventivo nelle colture ricche di polline e di distribuire la dose consigliata in più rilasci al comparire dei primi tripidi.

Conservazione e trasporto

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari

Trasportare e conservare al buio a 5-10°C

Usare entro 18 ore dal momento della consegna

Accorgimenti

I fattori che possono influenzare negativamente l'insediamento e la diffusione di Orius sono le temperature al di sotto dei 15°C o al di sopra dei 35°C e un fotoperiodo breve. Risulta ideale quindi nei trattamenti primaverili.

Una strategia efficace contro i tripidi prevede l'uso autunnale di Amblyline cu, seguito da Oriline I nel periodo primaverile.