Anderline aa

Acariens

Amblyseius andersoni est un acarien prédateur qui peut être utilise pour le contrôle d'un grand nombre d'espèces d'acariens nuisibles : Tetranychus urticae, Panonychus ulmi , Eriophydes comme *Aculops lycopersici* (agent de l'acariose bronzée de la tomate) ou les Tarsonèmes…

Il peut aussi se nourrir de larves de thrips. Cet auxiliaire est idéal pour les cultures maraîchères, en pépinières ornementales et en arboriculture fruitière. Il est actif à des températures plus basses que les autres auxiliaires ce qui signifie qu'il peut être introduit plus tôt en saison. Il est disponible **en mini sachet avec une anse** ou en sachet waterproof **GEMINI** qui permettent un usage dans les cultures sous aspersion ou en extérieur en cas de pluie

.

Caractéristiques et Avantages

- **Contrôle plusieurs espèces nuisibles d'acariens phytophages**
- **Pour les cultures sous abris ou en extérieur**
- **Une libération lente (RS) qui maintien une protection durable**
- **Idéal en petits fruits rouges, fraisiculture et en arboriculture**
- **Idéal en pépinières ornementales (Choisya, Ceanothus…)**
- **Tolérant aux températures de 6ºà 40ºC.**
- **Actif très tôt en saison...**

Informations générales

Amblyseius andersoni est présent naturellement en Europe occidentale, ainsi qu'au Canada et aux Etats unis. A l'origine il a été découvert dans les cultures de vignes et de pommiers, sur fraisiers, pêches, conifères et plantes à feuilles caduques. Il peut entrer en diapause hivernale, mais ils sont actifs dès que la durée du jour rallonge en Janvier Février ; de plus ils tolèrent des températures élevées si le taux d'humidité de l'atmosphère reste supérieur à 50%.

Instructions d'usage

Sachet Gemini – en sortant le sachet de la boîte plier le de sorte que le logo Bioline soit face externe et que les trous de libération (côté face blanche) soit protégés ; poser les sachets à cheval sur le fil de culture, sur une tige ou une branche.

Introduire à 2 - 4 mètres de rang de culture.

Syngenta Bioline Ltd.
Telstar Nursery, Holland Road, Little Clacton | Essex CO16 9QG | England
Tel: +44 (0) 1255 863 200 | Fax: +44 (0) 1255 863 206 | sales@syngentabioline.com | www.syngentabioline.com

Mini sachet- accrocher aux plantes grâce à l'anse. NE PAS ACCROCHER SUR LES TUYAUX DE CHAUFFAGE. Durée moyenne de libération : 6 semaines. Ensuite contrôler régulièrement le taux d'occupation face inférieure du feuillage.

Introduire à 2 mètres de rang de culture. En complément utiliser les tubes ou sac d'Anderline aa pour les foyers.

Introduire Anderline aa tôt dans les cultures pour enrayer les cycles d'acariens nuisibles.

Stockage et transport

Protéger du froid et aussi du soleil direct. Transport et stockage à 10-15°C .Utiliser dans les 18 heures après réception.

Syngenta Bioline Ltd.
Telstar Nursery, Holland Road, Little Clacton | Essex CO16 9QG | England
Tel: +44 (0) 1255 863 200 | Fax: +44 (0) 1255 863 206 | sales@syngentabioline.com | www.syngentabioline.com